

Oiythip Yasopa, Pawinee Doun-ngern

Division of Epidemiology, Department of Disease Control, Thailand

✉ o.thippa@gmail.com

อัยทิพย์ ยาโสภา, ภาวินี ดวงเงิน

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-18 พฤศจิกายน 2566 มีรายงานผู้ป่วย 404,896 ราย อัตราป่วย 611.89 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 26 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 7 ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพชรบูรณ์ สงขลา สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 2 ราย จังหวัดตาก พิษณุโลก ชัยภูมิ ราชบุรี ปทุมธานี นครศรีธรรมราช และลำพูน จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.006 ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 2,165.92 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (2,111.45) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (626.11) ตามลำดับ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคกลาง เท่ากับ 748.81 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคเหนือ (624.90) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (526.61) และภาคใต้ (449.04) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง อัตราป่วย 1,887.58 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภูเก็ต (1,307.74) กรุงเทพมหานคร (1,143.62) เชียงใหม่ (1,143.16) ลำพูน (1,010.30) ฉะเชิงเทรา (981.52) อุบลราชธานี (970.13) นครปฐม (903.21) จันทบุรี (861.49) และหนองคาย (849.25) ตามลำดับ

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการ คล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาล เครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-18 พฤศจิกายน 2566 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 9,260 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1,328 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.34 แยกเป็นชนิด A/H3N2 จำนวน 555 ราย (ร้อยละ 41.79) ชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 480 ราย (ร้อยละ 36.15) และ ชนิด B จำนวน 293 ราย (ร้อยละ 22.06) ในสัปดาห์ที่ 46 (ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน-18 พฤศจิกายน) ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจทั้งสิ้น 258 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 13 แห่ง พบให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 60 ราย คิดเป็นร้อยละ

23.26 แยกเป็นชนิด B จำนวน 33 ราย (ร้อยละ 55.00) ชนิด A/H3N2 จำนวน 22 ราย (ร้อยละ 36.67) และชนิด A/H1N1 (2009) จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 8.33) จากการติดตามอาการผู้ป่วย ทั้ง 258 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าว-การระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-18 พฤศจิกายน 2566 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 82 เหตุการณ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด สงขลา จังหวัดละ 5 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี กรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 4 เหตุการณ์ จังหวัดกระบี่ เพชรบูรณ์ แพร่ จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ จังหวัดนราธิวาส ระยอง ยโสธร ชลบุรี สุรินทร์ สระบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์ สมุทรสงคราม สระแก้ว นครราชสีมา สุโขทัย บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุบลราชธานี จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ จังหวัด พะเยา สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี เพชรบุรี นครนายก พิษณุโลก สตูล ราชบุรี ลำพูน กาฬสินธุ์ ภูเก็ต มหาสารคาม บึงกาฬ ชุมพร เชียงราย ลพบุรี น่าน ลำปาง เชียงใหม่ และเลย จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ ในสัปดาห์ที่ 46 (ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน) มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 5 เหตุการณ์ ดังนี้

1) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 34 ราย ในค่ายทหารแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ และมีน้ำมูก ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 34 ราย ที่โรงพยาบาลทหาร ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 34 ราย (ร้อยละ 100.00)

2) ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ 21 ราย ในค่ายทหารแห่งหนึ่ง จังหวัดเลย เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ด้วยอาการ คล้ายไข้หวัดใหญ่ ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus จำนวน 21 ราย ผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 21 ราย (ร้อยละ 100.00)


3) ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 125 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดแพร่ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีน้ำมูก ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี

Rapid test for Influenza virus จำนวน 6 ราย ผลตรวจพบเชื้อ
ใช้หวัดใหญ่ 6 ราย (ร้อยละ 100.00) และส่งตรวจยืนยันการติด
เชื้อใช้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 5 ราย ที่
สถาบันบำราศนราดูร ผลตรวจพบเชื้อใช้หวัดใหญ่ ชนิด A/H1N1
(2009) 4 ราย (ร้อยละ 80.00)

4) ผู้ป่วยเข้าข่ายใช้หวัดใหญ่ 17 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ด้วย
อาการไข้สูง ไอ ปวด เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ดำเนินการ
เก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี Rapid test for Influenza virus


จำนวน 17 ราย ผลตรวจพบเชื้อใช้หวัดใหญ่ ชนิด B จำนวน 17 ราย
(ร้อยละ 100.00)

5) ผู้ป่วยใช้หวัดใหญ่ 34 ราย ในศูนย์พัฒนาอาชีพคน
พิการแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2566 ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ และปวดศีรษะ
ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อใช้หวัดใหญ่ด้วย
วิธี Real time RT-PCR จำนวน 5 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร
ผลตรวจพบเชื้อใช้หวัดใหญ่ ชนิด A H3N2 5 ราย (ร้อยละ
100.00)



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตใช้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565, 2566 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคใช้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565-18 พฤศจิกายน 2566