



ปีที่ 52 ฉบับที่ 44 : 12 พฤศจิกายน 2564

Volume 52 Number 44: November 12, 2021

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Division of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health



สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ (Outbreak Verification Summary)

อัญชลี สิทธิชัยรัตน์, วรรณฯ สามารถ, กิตติพัทธ์ วรเชษฐ์, พิพัฒน์ สังข์ทอง, ตะวัน ทองสว่าง, ปราชญ์ปฐม สายพฤกษ์, พัชรียา กิจชม, ศุภสิทธิ์ สือรุ่งเรือง, วรพทย์ บุญดิเรก, ปทุมมาลย์ ศิลภาพร

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

✉ outbreak@health.moph.go.th

สถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่ 44 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2564 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรคและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

สถานการณ์ภายในประเทศ

1. การเสียชีวิตเป็นกลุ่มก่อนจากการจราจรทางถนน จังหวัดสระแก้ว

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 21.00 น. บนถนนทางหลวงชนบท สระแก้ว หมายเลข 3036 บริเวณหน้าโรงเรียนคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว รถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน กทม. บรรทุกแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา จำนวน 12 ราย คนไทย 1 ราย (คนขับรถยนต์) บริเวณดังกล่าวเป็นวงเวียนขนาดเล็ก กระบะคันดังกล่าวแล่นมาด้วยความเร็วป็นขอบของวงเวียนจึงเสียหลักพลิกคว่ำ พุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าข้างทาง พบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 5 ราย เป็นชาวไทย 1 ราย (เพศชาย) ชาวกัมพูชา 4 ราย (เพศชาย 1 ราย เพศหญิง 3 ราย) และบาดเจ็บ 8 ราย เป็นชาวกัมพูชา (เพศชาย 7 ราย เพศหญิง 1 ราย)

การดำเนินการ ลงพื้นที่สอบสวนโรค และวางแผนป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุซ้ำในจุดเกิดเหตุดังกล่าวติดป้ายเตือนก่อนถึงบริเวณ จุดเกิดเหตุ หรือช่วงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อให้ผู้ใช้รถเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากยิ่งขึ้น

2. สงสัยโรคคอตีบ จังหวัดพิจิตร พบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ จำนวน 1 ราย เพศชาย อายุ 23 ปี สัญชาติไทย อาชีพนักศึกษา เริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ด้วยอาการเจ็บคอ มีไข้ กลืนลำบาก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางมูลนาก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้น R/O Diphtheria ผู้ป่วยมีประวัติการได้รับวัคซีน Diphtheria 5 ครั้ง ผล Throat swab เบื้องต้นพบ Gram positive cocci in pair และ Gram negative bacilli จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบผู้สัมผัสร่วมบ้าน 4 ราย ผู้สัมผัสในที่ทำงาน 1 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพิ่มเติม



◆ สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 44 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2564	641
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 44 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2564	644
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจากบัตรรายงาน 506 ประจำเดือนตุลาคม 2564	649

3. สถานการณ์โรคและภัยที่น่าสนใจในประเทศไทย

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 ตุลาคม 2564 มีรายงานผู้ป่วย 9,465 ราย อัตราป่วย 14.57 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในสัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยยังคงมีแนวโน้มลดลง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ยังคงพบในเด็กเล็ก กลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 122.39 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา เป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (19.48) และ 15-24 ปี (9.96) ตามลำดับ

ภาคเหนือ มีอัตราป่วยสูงสุด เท่ากับ 25.53 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (15.16) ภาคใต้ (14.36) และภาคกลาง (7.34) ตามลำดับ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ อุบลราชธานี อัตราป่วย 56.88 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ พิษณุโลก (48.99) เชียงราย (42.19) น่าน (40.00) ตาก (38.78) กระบี่ (37.93) ยโสธร (36.01) สุโขทัย (35.34) ลำปาง (33.12) และ แม่ฮ่องสอน (32.36) ตามลำดับ

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 ตุลาคม 2564 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 3,157 ราย พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.06 โดยเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2 ทั้ง 2 ราย (ร้อยละ 100) โดยใน สัปดาห์ที่ 43 (ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม-30 ตุลาคม 2564) ได้รับ ตัวอย่างส่งตรวจทั้งสิ้น 81 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 9 แห่ง ผลตรวจไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้ง 81 ราย จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 81 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-3 พฤศจิกายน 2564 จากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506

คณะที่ปรึกษา

นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน นายแพทย์ประยูร ภูนาตล
นายแพทย์ดำนวล อึ้งชูศักดิ์ นายสัตวแพทย์ประวิทย์ ชุมเกษียร
องอาจ เจริญสุข

หัวหน้ากองบรรณาธิการ : นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

บรรณาธิการวิชาการ : นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

กองบรรณาธิการ

คณะทำงานด้านบรรณาธิการ กองระบาดวิทยา

ฝ่ายข้อมูล

สมาน สุขุมภูจินันท์ ศศิธน์ มาแถม พิชิ ตรีหมอก

กองระบาดวิทยา พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever: DF, Dengue haemorrhagic fever: DHF, Dengue shock syndrome: DSS) สะสม 8,396 ราย อัตราป่วย 12.63 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยสะสมน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 83 โดยภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง 3,953 ราย เพศชาย 4,443 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย คือ 1 : 1.12 อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 5-14 ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 0-4 ปี ตามลำดับ ผู้ป่วยเสียชีวิต 6 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.08 เป็นเพศชาย 5 ราย และเพศหญิง 1 ราย อยู่ในกลุ่มอายุ 5-14 ปี และ 65 ปีขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในเด็ก คือ มีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน และในผู้สูงอายุ คือ การมีโรคประจำตัวเรื้อรัง

4. การประเมินความเสี่ยงของโรคเลปโตสไปโรสิส

จากการเฝ้าระวังข่าวและเหตุการณ์ผิดปกติของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-2 พฤศจิกายน 2564 พบผู้ป่วย 779 ราย จาก 52 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.17 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 4.35 : 1 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 35-44 ปี (17.84 %) 45-54 ปี (17.46 %) และ 25-34 ปี (16.43%) ส่วนใหญ่มีสัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.4 พม่าร้อยละ 4.0 กัมพูชาร้อยละ 0.8 ลาวร้อยละ 0.5 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรกร ร้อยละ 32.3 รองลงมา รับจ้าง ร้อยละ 29.4 และนักเรียนร้อยละ 18.0 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ระนอง (43.26 ต่อแสนประชากร) พังงา (11.56 ต่อแสนประชากร) พัทลุง (11.05 ต่อแสนประชากร) จันทบุรี (8.76 ต่อแสนประชากร) ยะลา (7.70 ต่อแสนประชากร) ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 5.00 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 0.83 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.70 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.22 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

ในปี พ.ศ. 2564 จำนวนผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสพบแนวโน้มสูงในเดือนมกราคม จากนั้นมีแนวโน้มลดลง และเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม โดยอัตราป่วยและอัตรายตายต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2564 มีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยรายเดือน พบว่าปี พ.ศ. 2564 พบผู้ป่วยน้อยกว่าปี พ.ศ. 2563 ทุกเดือน ยกเว้นในเดือนกรกฎาคม จากข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์กรมควบคุมโรค พบผู้เสียชีวิตสงสัยโรคเลปโตสไปโรสิส รวม 5 ราย

อยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ 4 ราย คือ นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง และยะลา จังหวัดละ 1 ราย และจังหวัดในภาคตะวันออก 1 ราย คือ จังหวัดจันทบุรี

คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากผลกระทบของอุทกภัยตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและสภาพพื้นดินเปียกชื้นในหลายพื้นที่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ควรสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ประสบอุทกภัย หากต้องเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับน้ำ เช่น ถุงมือยาง รองเท้าบูท และอาบน้ำทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ รวมทั้งหมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใส่ในภาชนะมีดิด นอกจากนี้ควรล้างผัก ผลไม้ให้สะอาดก่อนนำมารับประทาน หากมีอาการสงสัยโรคเลปโตสไปโรซิส ให้รีบพบแพทย์อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว และรักษาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ควรเพิ่มมาตรการการเฝ้าระวัง และกรายงานผู้ป่วยสงสัยเพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคให้ได้อย่างรวดเร็ว และป้องกันการระบาดเป็นวงกว้าง

สถานการณ์ต่างประเทศ

สถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ในคน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา รายงานการเฝ้าติดตามไวรัสทางเดินหายใจที่มีศักยภาพในการแพร่ระบาดทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ได้ระบุถึงการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิด A (H5N6) ในคน อีก 3 ราย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N6) ในปี พ.ศ. 2564 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเป็นสองเท่า นับตั้งแต่พบไวรัสครั้งแรกในคน (ปี พ.ศ. 2557) ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนเพิ่มเติมและศักยภาพในการระบาดของไวรัสนี้

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เมื่อมีการตรวจพบการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H5N6) ในคนเป็นครั้งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีรายงานผู้ติดเชื้อดังกล่าว 51 ราย โดย 25 ราย พบในปี พ.ศ. 2564 ผู้ป่วย 24 ราย จากทั้งหมด 25 ราย อยู่ในประเทศจีน และ 1 ราย อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ป่วยใน สปป.ลาว เป็นการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H5N6) ในคนรายแรกที่รายงานนอกประเทศจีน

ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ A (H5N6) ส่วนใหญ่ที่รายงานในประเทศจีนในช่วงปี พ.ศ. 2564 มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกก่อนที่จะเริ่มป่วย ผู้ติดเชื้อล่าสุด 3 ราย เกิดขึ้นในผู้ใหญ่ ซึ่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีรายงานว่าเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรืออยู่ในภาวะวิกฤต ในปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H5N6) จำนวน 7 ราย (ทั้งหมดอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N6) ในคนจำนวน 51 ราย มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิต 25 ราย