

Somkid Kraipattanapong

Division of Epidemiology, Department of Disease Control

สมคิด ไกรพัฒน์พงศ์

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-6 พฤษภาคม 2566 มีรายงานผู้ป่วยสะสม 13,225 ราย อัตราป่วย 20.01 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

กลุ่มอายุ 1-4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด เท่ากับ 375.96 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ต่ำกว่า 1 ปี (181.04) และ 5-9 ปี (78.78) ตามลำดับ

ภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด เท่ากับ 27.54 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคใต้ (23.44) ภาคกลาง (21.69) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (12.55) ตามลำดับ


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ภูเก็ต (90.21) จันทบุรี (72.93) และ เชียงราย (55.94) ตามลำดับ

ปี พ.ศ. 2565 กองระบาดวิทยาได้รับตัวอย่างจากโครงการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคมือเท้าปาก (HFMD) โรคแผลในคอกอย (Herpangina) และสงสัยติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร ทางห้องปฏิบัติการจำนวน 107 ราย จากโรงพยาบาล 8 แห่ง ส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร พบให้ผลบวกต่อสารพันธุกรรมไวรัสเอนเทอโร

จำนวน 68 ราย ร้อยละ 63.55 เป็นสายพันธุ์ Coxsackievirus A6 ร้อยละ 77.94 (53 ราย) Coxsackievirus A10 ร้อยละ 10.29 (7 ราย) Coxsackievirus A4, B1, Enterovirus 71 และ Rhinovirus spp. ร้อยละ 1.47 (สายพันธุ์ละ 1 ราย) และ Panenterovirus (ไม่ระบุสายพันธุ์) ร้อยละ 4.41 จำนวน 3 ราย

ปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-6 พฤษภาคม 2566 ได้รับตัวอย่าง จำนวน 74 ราย จากโรงพยาบาล 14 แห่ง ส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร พบให้ผลบวกต่อสารพันธุกรรมไวรัสเอนเทอโร จำนวน 46 ราย ร้อยละ 60.53 จำแนกเป็นสายพันธุ์ Coxsackievirus A16 ร้อยละ 43.75 (21 ราย) Coxsackievirus A10 ร้อยละ 33.33 (16 ราย) Coxsackievirus A6 ร้อยละ 6.25 (3 ราย) Rhinovirus spp., Coxsackievirus A4 และ Enterovirus 71 ร้อยละ 4.17 (สายพันธุ์ละ 2 ราย) และ Coxsackievirus A9 ร้อยละ 2.08 (1 ราย) (รูปที่ 1)

สัปดาห์ที่ 18 ไม่มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ



รูปที่ 1 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยโรคมือเท้าปาก และสงสัยติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และร้อยละของการตรวจพบเชื้อไวรัสเอนเทอโรสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563-6 พฤษภาคม 2566