



รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์
Weekly Epidemiological Surveillance Report, Thailand

ปีที่ 40 ฉบับที่ 42 : 30 ตุลาคม 2552 Volume 40 Number 42 : October 30, 2009

สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health

สถานการณ์โรค/ภัยที่สำคัญ

สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและอหิวาตกโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2552
(ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค 506 และ Priority diseases ณ 26 ตุลาคม 2552)

Situation of Acute diarrhea and Cholera in Thailand, 2009 (Data from 506 Surveillance System and Priority diseases on 1 Jan – 26 Oct 2009)

✉ checheamorn@yahoo.com

อมรรัตน์ ขอบกตัญญู อาทิวราห์ คงอามา สำนักโรคระบาดวิทยา

ตั้งแต่ 1 มกราคม-26 ตุลาคม พ.ศ.2552 ประเทศไทยพบผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันทั้งสิ้น 984,052 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,561.04 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 88 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.11 ต่อประชากรแสนคน โดยเมื่อเทียบจำนวนผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน พ.ศ.2552 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังพบว่า ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีจำนวนผู้ป่วยสูงเกินค่ามัธยฐาน หลังจากมิถุนายนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 1)

จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเคื่อกันยายน พ.ศ.2552 สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง เดือนเดียวกัน ได้แก่ สมุทรปราการ 2,003 ราย (ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังเท่ากับ 1,464 ราย) เชียงราย 2,335 ราย (1,909) นครสวรรค์ 1,741 ราย (1,406) ชลบุรี 1,245 ราย (1,011) พิจิตร 695 ราย (477) นนทบุรี 1,343 ราย (1,162) ร้อยเอ็ด 2,385 ราย (2,292) พิษณุโลก 870 ราย (796) น่าน 829 ราย (778) ระนอง 271 ราย (237) ภูเก็ต 744 ราย (710) ตรัง 352 ราย (320) และอุดรดิศ 492 ราย (475) จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยใกล้เคียงค่ามัธยฐานซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ อ่างทอง 497 ราย (ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 520 ราย) นครนายก 409 ราย (437) นครปฐม 1,569 ราย (1,608) ชัยนาท 332 ราย (392) มหาสารคาม 1,103 ราย (1,169) มุกดาหาร 342 ราย (410) สงขลา 1,543 ราย (1,612) ลำปาง 1,177 ราย (1,255) อุทัยธานี 343 ราย (422) และจันทบุรี 553 ราย (652)


สถานการณ์อหิวาตกโรคจากระบบเฝ้าระวัง Priority Diseases พ.ศ.2552 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น 45 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.07 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นชาวไทย 25 ราย พม่า 20 ราย โดยพบผู้ป่วยใน 11 จังหวัด เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งหมด (Passive case) ได้แก่ ระนอง 26 ราย ตาก 5 ราย กรุงเทพมหานครและขอนแก่น จังหวัดละ 3 ราย อุดรธานี 2 ราย ภูเก็ต นนทบุรี ระยอง พัทลุง ยะลาและสมุทรสาคร จังหวัดละ 1 ราย (รูปที่ 2)

จังหวัดระนองพบผู้ป่วยมากที่สุดและยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2552 พบว่าผู้ป่วย 26 ราย มาจากอำเภอเมืองระนอง 23 ราย ละอุ่น 2 ราย และกระบุรี 1 ราย ซึ่งในช่วงแรกของการระบาด พบผู้ป่วยที่ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนองจำนวน 4 ราย ระหว่างวันที่ 18 - 30 สิงหาคม 2552 โดยผู้ป่วยทั้งหมดเป็นชาวพม่าและเกิดจากเชื้อ *Vibrio cholerae* El Tor Inaba ต่อมาวันที่ 3 - 24 กันยายน 2552 พบผู้ป่วยกระจายไปยังตำบลปากน้ำจำนวน 4 ราย เป็นชาวไทย 1 ราย พม่า 3 ราย และเกิดจากเชื้อ *V. cholerae* ทั้ง 2 serotype ในเดือนตุลาคม 2552 พบผู้ป่วยในบางรีน อำเภอเมืองระนอง 5 ราย ชาวพม่า 3 ราย ชาวไทย 2 ราย เกิดจาก *V. cholerae* El Tor Ogawa 4 ราย *V. cholerae* El Tor Inaba 1 ราย โดยจากการสอบถามข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง พบว่า

สารบัญ

◆ สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและอหิวาตกโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2552 ณ 26 ตุลาคม 2552	701
◆ โรคเลปโตสไปโรซิส ปี พ.ศ. 2551	703
◆ รายงานการบาดเจ็บรุนแรงจากพลุ และดอกไม้ไฟ ช่วงเดือน พฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2551 และ “วันลอยกระทง”	704
◆ สรุปการตรวจข่าวของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 42 ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2552	708
◆ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในกุนยา ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2552	710
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์ที่ 42 ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2552	711

รูปที่ 3 จำนวนผู้ป่วยอหิวาตกโรคเทียบกับแนวโน้มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน กรกฎาคม – กันยายน 2552 จ.ระนอง



โรคเลปโตสไปโรซิส ปี 2551 (Leptospirosis, 2008)

พ.ศ. 2551 สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส จาก 71 จังหวัด (ไม่มีรายงานผู้ป่วยจากจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม และลำพูน) จำนวน 4,210 ราย เสียชีวิต 73 ราย อัตราป่วย 6.66 ต่อประชากรแสนคน อัตราตาย 0.12 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย ร้อยละ 1.73 พบผู้ป่วยสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,926 ราย เสียชีวิต 51 ราย ภาคเหนือ 491 ราย เสียชีวิต 13 ราย ภาคใต้ 580 ราย เสียชีวิต 2 ราย และภาคกลาง 213 ราย เสียชีวิต 7 ราย อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนตามรายภาค เท่ากับ 13.66, 4.13, 6.67 และ 1.0 ตามลำดับ (รูปที่ 1)

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ บุรีรัมย์ (46.98) กาฬสินธุ์ (38.96) เลย (27.55) พังงา (24.96) ศรีสะเกษ (22.47) ขอนแก่น (19.50) สุรินทร์ (17.25) พะเยา (16.63) น่าน (16.57) และนครศรีธรรมราช (15.76)

ผู้ป่วยเพศชาย 3,352 ราย เพศหญิง 858 ราย อัตราส่วนหญิงต่อชาย 3.9 : 1 พบผู้ป่วยในทุกกลุ่มอายุ กลุ่มอายุ 55-64 ปี ขึ้นไปมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ 11.21 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 45 - 54 ปี อัตราป่วย 10.01 กลุ่มอายุ 35-44 ปี อัตราป่วย 9.06 กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี อัตราป่วย 6.81 กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วย 5.8 และกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี อัตราป่วย 5.19 (รูปที่ 2) ผู้ป่วยมีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 57.84 รับจ้าง ร้อยละ 17.10 และนักเรียน ร้อยละ 8.96 ผู้ป่วยอยู่ในเขตเทศบาล ร้อยละ 8.98 เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 91.02 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 62.33 โรงพยาบาลศูนย์ ร้อยละ 18.81 และโรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 16.94

