



รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์
Weekly Epidemiological Surveillance Report, Thailand

ปีที่ 43 ฉบับที่ 10 : 16 มีนาคม 2555

Volume 43 Number 10 : March 16, 2012

สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health



สถานการณ์และแนวโน้มการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต จากการถูกทำร้าย
ในประเทศไทย พ.ศ. 2548 - 2553

(Trends and Situation of Severe Injuries and Deaths due to Assaults, Thailand, 2005 - 2010)

✉ anongtip1@yahoo.com

อนงค์ แสงจันทร์ทิพย์ และพิมพ์ภา เตชะกมลสุข
สำนักโรคติดต่อ

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกทำร้าย ยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีขนาดความรุนแรงอยู่ในระดับต้นๆ ของสาเหตุการบาดเจ็บทุกประเภท

รัฐบาลยังไม่มียุทธศาสตร์ส่งเสริมการลดปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม การนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้น่าจะมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้

สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเริ่มเก็บข้อมูลครั้งแรก ปี พ.ศ. 2538 โดยเก็บรวบรวมรายงานจากโรงพยาบาลที่ถูกคัดเลือกเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังปัจจุบันมีโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งหมด จำนวน 33 แห่ง ในการวิเคราะห์แนวโน้มครั้งนี้ จะใช้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บในปี พ.ศ. 2548-2553 จากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 28 แห่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการบ่งชี้ถึงสภาพปัญหา ขนาด และแนวโน้มการบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายได้ชัดเจนมากขึ้น ในการจะนำไปแก้ไขปัญหาคือ

รายงานจาก โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บฯ 28 แห่ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2548 -2553 พบว่า มีผู้บาดเจ็บรุนแรงจากทุกสาเหตุ รวมทั้งสิ้น 939,585 ราย เฉลี่ยปีละ 156,597 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 45,065 ราย เฉลี่ยปีละ 7,511

รายงานครั้งนี้จะวิเคราะห์เชิงระบาดวิทยาเฉพาะการบาดเจ็บที่มีสาเหตุการถูกทำร้ายดังนี้

จำนวนการบาดเจ็บจากการถูกทำร้าย จากข้อมูลโรงพยาบาลเครือข่าย 28 แห่ง ปี พ.ศ. 2548-2553 ได้รับรายงานการบาดเจ็บรวม 89,592 ราย เฉลี่ยปีละ 14,932 ราย ซึ่งมากเป็นลำดับที่ 4 ของทุกปีจากการบาดเจ็บทุกสาเหตุ สัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 9.10 - 10.00 และแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2549, 2552 ลดลงปี พ.ศ. 2550-2551 และ 2553 (รูปที่ 1) (ตารางที่ 1)

การบาดเจ็บจากการถูกทำร้าย พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง อัตราส่วน ชาย : หญิง เท่ากับ 6.3 : 1 พบมาก ในกลุ่มอายุ 15 - 29 ปี รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 30 - 44 ปี กลุ่มอายุ 45 - 59 ปี กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี และกลุ่มอายุ ≥ 60 ปี ร้อยละ 55.41, 27.00, 11.15, 3.43 และ 2.99 ตามลำดับ (รูปที่ 2)

อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายสูงสุด คือ Head ร้อยละ 27.50 รองลงมา ได้แก่ Injuries of multiple regions ร้อยละ 15.37 และ Unknown diagnosis ร้อยละ 9.00

ผู้ถูกทำร้ายส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงานสูงสุด ร้อยละ 46.52 รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 14.58 และเกษตรกร ร้อยละ 10.08 (รูปที่ 3)



◆ สถานการณ์และแนวโน้มการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต จากการถูกทำร้าย ในประเทศไทย พ.ศ. 2548 - 2553	145
◆ ข้อปฏิบัติเพื่อการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในพื้นที่ประสบภัยจากหมอกควันไฟป่า (ระยะสั้น)	150
◆ สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2555	153
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2555	155

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์

1. เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. เพื่อวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์โรคที่เป็นปัจจุบัน ทั้งใน และต่างประเทศ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลการสอบสวนโรค หรืองานศึกษาวิจัยที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข

คณะที่ปรึกษา

นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน นายแพทย์ประยูร กุมาตล
 นายแพทย์ธวัช จายนัยโยธิน นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
 นายแพทย์ดำนวน อึ้งชูศักดิ์ นายสัตวแพทย์ประวิทย์ ชุมเกษียร
 นายองอาจ เจริญสุข

หัวหน้ากองบรรณาธิการ : นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี

บรรณาธิการประจำฉบับ : บริมาศ ตักดีศิริสัมพันธ์

บรรณาธิการวิชาการ : แพทย์หญิงพิมพ์ภา เตชะกมลสุข

กองบรรณาธิการ

บริมาศ ตักดีศิริสัมพันธ์ สิริลักษณ์ รังมีวงศ์ พงษ์ศิริ วัฒนาสุรภิตต์
 กรรณิการ์ หมอนพั้งเทียม


ฝ่ายข้อมูล

สมาน สมยมกรจันันท์ พัชรี ศรีหมอก
 น.สพ. ธีรศักดิ์ ชักนำ สมเจตน์ ตั้งเจริญศิลป์

ฝ่ายจัดส่ง : พูนทรัพย์ เปียมณี เขิดชัย ดาราแจ้ง


ฝ่ายศิลป์ : ประมวล ทุมพงษ์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : บริมาศ ตักดีศิริสัมพันธ์



ที่มา: ข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 28 แห่ง
 รูปที่ 1 จำนวนการบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทำร้าย

ปี พ.ศ. 2548-2553



ที่มา: ข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 28 แห่ง
 รูปที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้บาดเจ็บจากการถูกทำร้าย จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2548-2553

สถานพยาบาลที่รักษาผู้บาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทำร้ายสูงสุด ได้แก่ รพ.นครราชสีมา ร้อยละ 7.44 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร้อยละ 6.57 และรพ.ขอนแก่น ร้อยละ 5.84 (รูปที่ 4)


สถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บรุนแรง ร้อยละ 91.76 นอกจังหวัด ร้อยละ 6.91 ไม่ทราบอำเภอและจังหวัด ร้อยละ 1.33

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกทำร้าย บริเวณที่เกิดเหตุเป็น บ้าน/บริเวณบ้าน มากที่สุด ร้อยละ 39.43 ถนนหรือทางหลวง ร้อยละ 23.45 และสถานที่ขายสินค้าและบริการ ร้อยละ 14.77

ช่วงเวลาการเกิดการถูกทำร้าย พบมากที่สุด ระหว่างเวลา 18.00 - 23.59 น. ร้อยละ 46.63 ระหว่างเวลา 00.00 - 05.59 น. ร้อยละ 28.74 และเวลา 12.00 - 17.59 น. ร้อยละ 15.32

วันอาทิตย์มีการเกิดเหตุและการบาดเจ็บ มากที่สุด ร้อยละ 17.24 และวันพุธ มีการเกิดเหตุที่น้อยที่สุด ร้อยละ 12.74

เดือนเมษายน พบจำนวนผู้บาดเจ็บรุนแรงมากที่สุด ร้อยละ 10.34 พบน้อยที่สุดในเดือนพฤษภาคม ร้อยละ 7.36




ที่มา: ข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 28 แห่ง
 รูปที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้บาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทำร้าย จำแนกตามอาชีพ ปี พ.ศ. 2548 - 2553

วิธีการทำร้ายพบบ่อยที่สุด คือ การถูกทำร้ายโดยการใช้
วัตถุมีคม ร้อยละ 34.81 รองลงมา ได้แก่ การถูกทำร้ายโดยการใช้
วัตถุไม่มีคม ร้อยละ 22.42 การถูกทำร้ายโดยการยิงด้วยอาวุธปืน
อื่นที่มีได้ระบุรายละเอียด ร้อยละ 16.24 และการถูกทำร้ายโดยการ
ใช้กำลังกาย ร้อยละ 14.08 (ตารางที่ 2)

การเสียชีวิตจากการถูกทำร้าย

การเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายจากข้อมูลโรงพยาบาล
เครือข่าย 28 แห่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 มีจำนวน 4,548 ราย
เฉลี่ยปีละ 758 ราย มากเป็นลำดับที่ 2 ในปี พ.ศ. 2548-2551 และ
เป็นลำดับที่ 3 ในปี พ.ศ. 2552-2553 ของการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บรุนแรงทุกสาเหตุ สัดส่วนอยู่ระหว่าง 9.82 - 10.49 แนวโน้ม
การบาดเจ็บตายพบสูงสุดในปี พ.ศ. 2548 ลดลงใน พ.ศ. 2549 -
2551 เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2552 และลดลงอีกในปี พ.ศ. 2553 (รูปที่ 5)
(ตารางที่ 3)

โรงพยาบาล



ที่มา: ข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 28 แห่ง

รูปที่ 4 ร้อยละสถานพยาบาลที่รักษาผู้บาดเจ็บจากการถูกทำร้าย ปี พ.ศ. 2548 – 2553

การเสียชีวิตจากการถูกทำร้าย พบในเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง อัตราส่วน ชาย: หญิง เท่ากับ 6.5 : 1 พบมาก ในกลุ่มอายุ
15-29 ปี ร้อยละ 42.26 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 30-44 ปี ร้อยละ
32.07 และกลุ่มอายุ 45 - 59 ปี ร้อยละ 17.72 (ตารางที่ 4)

อวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บจนเสียชีวิตจากการถูกทำร้าย
สูงสุด คือ Head ร้อยละ 31.88 รองลงมา ได้แก่ Injuries of
multiple region ร้อยละ 16.42 และ Thorax ร้อยละ 12.22

ผู้ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพผู้ใช้
แรงงานสูงสุด ร้อยละ 36.63 รองลงมาเป็นไม่ทราบอาชีพ ร้อยละ
16.64 และนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 10.09 (ตารางที่ 5)

ผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตในพื้นที่ร้อยละ 90.06 เสียชีวิตนอก
จังหวัดร้อยละ 8.97 เสียชีวิตไม่ทราบอำเภอและจังหวัด ร้อยละ 0.97
เดือนเมษายนมีผู้เสียชีวิตสูงสุด ร้อยละ 9.96 (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละการบาดเจ็บรุนแรง 5 สาเหตุ ลำดับแรก จำแนกตามสาเหตุการบาดเจ็บ ปี พ.ศ. 2548 – 2553

สาเหตุของการบาดเจ็บ		ปี พ.ศ.						รวม
		2548	2549	2550	2551	2552	2553	
อุบัติเหตุการขนส่ง	จำนวน	76,482	77,910	75,094	69,099	73,775	72,195	444,555
	ร้อยละ	48.98	47.90	47.36	46.20	46.49	46.90	47.31
พลัด ตก หรือ หกล้ม	จำนวน	24,746	25,977	25,528	25,437	27,225	26,259	155,172
	ร้อยละ	15.85	15.97	16.10	17.01	17.16	17.06	16.51
สัมผัสกับแรงเชิงกล วัตถุสิ่งของ	จำนวน	20,562	22,492	22,796	22,562	24,822	24,345	137,579
	ร้อยละ	13.17	13.83	14.38	15.08	15.64	15.81	14.64
ถูกทำร้ายด้วยวิธี ต่างๆ	จำนวน	15,533	16,261	15,424	13,704	14,668	14,002	89,592
	ร้อยละ	9.95	10.00	9.73	9.16	9.24	9.10	9.54
อื่น ๆ	จำนวน	18,834	20,020	19,729	18,771	18,195	17,138	112,687
	ร้อยละ	12.06	12.31	12.44	12.55	11.47	11.13	11.99
รวม	จำนวน	156,157	162,660	158,571	149,573	158,685	153,939	939,585
	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ที่มา: ข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 28 แห่ง

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละการบาดเจ็บจากการถูกทำร้าย จำแนกตามวิธีการทำร้าย ปี พ.ศ. 2548 -2553

วิธีการทำร้าย		ปี พ.ศ.						รวม
		2548	2549	2550	2551	2552	2553	
การใช้วัตถุมีคม	จำนวน	5,699	5,691	5,336	4,781	5,073	4,605	31,185
	ร้อยละ	36.69	35.00	34.60	34.89	34.59	32.89	34.81
การใช้วัตถุไม่มีคม	จำนวน	3,541	3,710	3,489	2,993	3,326	3,024	20,083
	ร้อยละ	22.80	22.82	22.62	21.84	22.68	21.60	22.42
การยิงด้วยอาวุธปืนอื่นที่ มิได้ระบุรายละเอียด	จำนวน	2,431	2,708	2,473	2,184	2,357	2,400	14,553
	ร้อยละ	15.65	16.65	16.03	15.94	16.07	17.14	16.24
การใช้กำลังกาย	จำนวน	2,013	2,197	2,176	1,986	2,054	2,193	12,619
	ร้อยละ	12.96	14.14	14.01	12.79	13.22	14.12	14.08
อื่น ๆ	จำนวน	1,849	1,955	1,950	1,760	1,858	1,780	11,152
	ร้อยละ	11.90	12.02	12.64	12.84	12.67	12.71	12.45
รวมทุกสาเหตุ	จำนวน	15,533	16,261	15,424	13,704	14,668	14,002	89,592
	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ที่มา: ข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 28 แห่ง

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละการเสียชีวิต 5 สาเหตุ ลำดับแรก จำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต ปี พ.ศ. 2548 – 2553


สาเหตุการเสียชีวิต		ปี พ.ศ.						รวม
		2548	2549	2550	2551	2552	2553	
อุบัติเหตุการขนส่ง	จำนวน	5,392	4,910	4,587	4,153	4,423	4,281	27,746
	ร้อยละ	63.70	62.59	61.83	60.57	60.50	59.69	61.56
ถูกทำร้ายด้วยวิธี ต่างๆ	จำนวน	851	823	749	702	719	704	4,548
	ร้อยละ	10.05	10.49	10.10	10.24	9.83	9.82	10.09
พลัด ตก หรือ หกล้ม	จำนวน	780	689	705	658	797	810	4,439
	ร้อยละ	9.21	8.78	9.50	9.60	10.90	11.29	9.85
ทำร้ายตัวเองด้วยวิธี ต่างๆ	จำนวน	575	505	496	484	524	511	3,095
	ร้อยละ	6.79	6.44	6.69	7.06	7.17	7.12	6.87
อื่น ๆ	จำนวน	867	918	882	859	848	863	5,237
	ร้อยละ	10.24	11.70	11.89	12.53	11.60	12.04	11.62
รวมทุกสาเหตุ	จำนวน	8,465	7,845	7,419	6,856	7,311	7,169	45,065
	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ที่มา: ข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 28 แห่ง

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้บาดเจ็บรุนแรงและผู้เสียชีวิตจากการถูกทำร้าย จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2548 - 2553

กลุ่มอายุ	ผู้บาดเจ็บรุนแรง		ผู้เสียชีวิต	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<15 ปี	3,070	3.43	120	2.64
15 - 29 ปี	49,643	55.41	1,920	42.26
30 - 44 ปี	24,190	27.00	1,457	32.07
45 - 59 ปี	9,993	11.15	805	17.72
>=60 ปี	2,681	2.99	241	5.30
Total	89,577	100.00	4,543	100.00

ที่มา: ข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 28 แห่ง



ที่มา: ข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 28 แห่ง

รูปที่ 5 จำนวนการเสียชีวิตของการบาดเจ็บจากการถูกทำร้าย ปี พ.ศ. 2548 - 2553

นอกจากนั้น ในกลุ่มผู้ถูกทำร้ายทำร้ายที่เสียชีวิต ส่วนใหญ่ถูกทำร้ายจากอาวุธปืน ร้อยละ 47.38 รองลงมา วัตถุมีคม ร้อยละ 21.46 และวัตถุไม่มีคม ร้อยละ 12.07

สรุปและข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า สภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจของประชาชนโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่น และวัยแรงงาน เช่น รายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย นอกจากนี้ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อมวลชนต่าง ๆ มีผลกระทบต่อให้เกิดการเลียนแบบการทำร้ายผู้อื่นมากขึ้น ในการแก้ปัญหา ควรให้ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดกวดขัน ในเรื่อง การซื้อหา ครอบครองและการพกพาอาวุธปืนของประชาชนอย่างจริงจัง หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสังคม พุทธกรรม จิตวิทยา อาชีววิทยา และอื่น ๆ ควรสนับสนุนการให้บริการปรึกษา (counselling) และการศึกษาปัญหานี้ เพื่อทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำร้าย ทั้งในด้านผู้ทำร้าย ผู้ถูกทำร้าย มูลเหตุ นำ และสถานการณ์ขณะเกิดเหตุเพื่อนำผลมาใช้ในการวางแผนป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายลงได้

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้เสียชีวิตจากการถูกทำร้าย จำแนกตามอาชีพ ปี พ.ศ. 2548 - 2553

อาชีพผู้เสียชีวิต	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ผู้ใช้แรงงาน	1,666	36.63
ไม่ทราบอาชีพ	757	16.64
นักเรียน/นักศึกษา	459	10.09
เกษตรกร	454	9.98
อื่น ๆ	1,212	26.65
รวม	4,548	100

ที่มา: ข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 28 แห่ง

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้บาดเจ็บรุนแรงและผู้เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายจำแนกตามรายเดือน ปี พ.ศ. 2548 - 2553

เดือน	ผู้บาดเจ็บรุนแรง		ผู้เสียชีวิต	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มกราคม	7,543	8.42	422	9.28
กุมภาพันธ์	7,174	8.01	387	8.51
มีนาคม	8,027	8.96	439	9.65
เมษายน	9,264	10.34	453	9.96
พฤษภาคม	6,598	7.36	363	7.98
มิถุนายน	6,807	7.60	366	8.05
กรกฎาคม	7,066	7.89	335	7.37
สิงหาคม	6,783	7.57	370	8.14
กันยายน	6,897	7.70	341	7.50
ตุลาคม	7,920	8.84	379	8.33
พฤศจิกายน	7,840	8.75	367	8.07
ธันวาคม	7,673	8.56	326	7.17
รวม	89,592	100.00	4,548	100.00

ที่มา: ข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 28 แห่ง

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 28 แห่ง

แนะนำการอ้างอิงสำหรับบทความนี้

อนงค์ แสงจันทร์ทิพย์ และ พิมพภา เตชะกมลสุข. สถานการณ์และแนวโน้มการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต จากการถูกทำร้าย ในประเทศไทย พ.ศ. 2548 - 2553. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ 2555; 43: 145-9.

Suggested Citation for this Article

Along Sangjantip, Pimpa Techakamonsuk. Trends and situation of severe injuries and deaths due to assaults, Thailand, 2005–2010. Weekly Epidemiological Surveillance Report 2012; 43: 145-9.