

สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ ประจำวัน ที่ 31 ตุลาคม 2535

กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในปี พ.ศ. 2527 กองระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์ 1 ราย และในปีต่อมา จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งหมด 1039 ราย เป็นผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ รวม 1,272 ราย

ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์รวม 398 ราย มีผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ 367 ราย
ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์ 529 ราย ได้รับรายงานผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์

553 ราย

ผู้ป่วยโรคเอดส์

ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากยอดครั้งที่แล้ว 93 ราย แยกเป็นผู้ป่วยปี พ.ศ. 2534 1 ราย พ.ศ. 2535

92 ราย รวมเป็นผู้ป่วยเอดส์ ทั้งสิ้น 1,039 ราย รายงานเพิ่มเติมได้รับจาก 26 จังหวัด แยกเป็นจังหวัดทางภาคเหนือ 48 ราย ภาคกลาง 29 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 ราย และภาคใต้ 7 ราย ผู้ป่วยเอดส์ที่รายงานในรอบนี้ เป็นเพศชาย 81 ราย รวมเป็น 902 ราย เพศหญิง 12 ราย รวมเป็น 137 ราย

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ 75 ราย

ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 12 ราย ทารกติดเชื้อจากมารดา 2 ราย รับเลือด 1 ราย และไม่ทราบ

ปัจจัยเสี่ยง 3 ราย ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 77.0

(800 ราย) แยกเป็นชายรักต่างเพศ ร้อยละ 65.5 (681 ราย) หญิงรักต่างเพศ ร้อยละ 7.6 (79 ราย)

ผู้ป่วยเอดส์ยังคงมีชีวิต 563 ราย เสียชีวิตไปแล้ว 476 ราย

ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์

ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากยอดครั้งที่แล้ว 83 ราย แยกเป็นผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2534 1 ราย

ปี พ.ศ. 2535 82 ราย รวมเป็นผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ทั้งสิ้น 1,272 ราย โดยได้รับรายงานจาก 25 จังหวัด แยกเป็นจังหวัดภาคเหนือ 58 ราย ภาคกลาง 22 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ราย

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้น 83 ราย เป็นกลุ่มที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ 57 ราย

ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 15 ราย ทารกติดเชื้อจากมารดา 5 ราย และไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง 6 ราย

ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 76.0 (967 ราย) เป็นประเภทชาย

รักต่างเพศ ร้อยละ 61.2 (778 ราย) หญิงรักต่างเพศ ร้อยละ 12.3 (156 ราย) กลุ่มทารกที่ติดเชื้อจากมารดา

ร้อยละ 4.2 (53 ราย) ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 16.0 (204 ราย) มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์

ส่วนใหญ่ยังคงมีชีวิตอยู่ 1,104 ราย ที่เสียชีวิตไปแล้ว 168 ราย

- หมายเหตุ 1. ได้ยกเลิกการรายงานผู้ติดเชื้อเอดส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2534) ลงวันที่ 4 กันยายน 2534 เรื่อง ชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญ
2. กองระบาดวิทยาทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อแก้ไขรายงานตามที่สำคัญงานสาธารณสุข จังหวัดแต่ละแห่งแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานผู้ป่วยตามบัตร 507/1

ตารางที่ 1

จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ (AIDS) แยกตามปัจจัยเสี่ยงและแยกตามรายปี
ที่เริ่มป่วยตั้งแต่กันยายน 2527 ถึง 31 ตุลาคม 2535

ปัจจัยเสี่ยง	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	รวม	(%)
1. เพศสัมพันธ์	1	1	-	6	2	24	42	292	432	800	77.0
-ชายรักร่วมเพศ	1	-	-	5	2	9	2	5	2	26	2.5
-ชายรักสองเพศ	-	1	-	-	-	4	4	4	1	14	1.3
-ชายรักต่างเพศ	-	-	-	1	-	10	31	260	379	681	65.5
-หญิงรักต่างเพศ	-	-	-	-	-	1	5	23	50	79	7.6
2. ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น	-	-	-	1	-	2	19	28	46	96	9.2
-ชาย	-	-	-	1	-	2	18	28	44	93	9.0
-หญิง	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	0.3
3. รับเลือด	-	-	-	-	1	1	1	2	5	10	1.0
-ชาย	-	-	-	-	-	1	1	2	5	9	0.9
-หญิง	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	0.1
4. ติดเชื้อจากมารดา	-	-	-	-	2	2	7	67	38	116	11.2
-ชาย	-	-	-	-	-	1	4	35	22	62	6.0
-หญิง	-	-	-	-	2	1	3	32	16	54	5.2
5. ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	9	8	17	1.6
-ชาย	-	-	-	-	-	-	-	9	8	17	1.6
-หญิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1	1	-	7	5	29	69	398	529	1039	100.0
ยังมีชีวิตอยู่	-	-	-	-	-	3	27	234	299	563	54.2

แหล่งข้อมูล : กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 2

จำนวนผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (ARC) แยกตามปัจจัยเสี่ยงและแยกตามรายปี
ที่เริ่มป่วยตั้งแต่กันยายน 2527 ถึง 31 ตุลาคม 2535

ปัจจัยเสี่ยง	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	รวม	(%)
เพศสัมพันธ์	-	5	8	12	1	44	163	278	456	967	76.0
-ชายรักร่วมเพศ	-	2	3	7	-	2	6	2	1	23	1.8
-ชายรักสองเพศ	-	1	4	1	-	2	2	-	-	10	0.8
-ชายรักต่างเพศ	-	1	-	1	-	28	122	227	399	778	61.2
-หญิงรักต่างเพศ	-	1	1	3	1	12	33	49	56	156	12.3
ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น	-	-	-	-	17	44	37	56	50	204	16.0
-ชาย	-	-	-	-	16	43	37	52	49	197	15.5
-หญิง	-	-	-	-	1	1	-	4	1	7	0.6
รับเลือด	-	-	-	-	1	1	1	2	1	6	0.5
-ชาย	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	0.3
-หญิง	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	0.2
ติดเชื้อจากมารดา	-	-	-	-	-	-	10	12	31	53	4.2
-ชาย	-	-	-	-	-	-	5	7	16	28	2.2
-หญิง	-	-	-	-	-	-	5	5	15	25	2.0
ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง	-	-	-	1	1	5	1	19	15	42	3.3
-ชาย	-	-	-	1	-	4	1	16	12	34	2.7
-หญิง	-	-	-	-	1	1	-	3	3	8	0.6
รวม	-	5	8	13	20	94	212	367	553	1272	100.0
ไม่รวมตัวอยู่	-	5	8	10	12	80	196	320	473	1104	86.8

แหล่งข้อมูล : กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

#####