

3. Bhaibulaya M. et al "Fresh water Fishes of Thailand as experimental intermediate hosts for *Capillaria philippinensis*". Int.J.Parasit. 1979, 9: 105-8.

ผู้รายงาน :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน, โรงพยาบาลน่าน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา, โรงพยาบาลเวียงสา, ศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือ จังหวัดลำปาง.

#####

### สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2536

#### กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในปี พ.ศ.2527 กองระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์ 1 ราย และในปีต่อมา จนถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2536 ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งหมด 1,878 ราย เป็นผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ รวม 2,129 ราย

ในปี พ.ศ.2534 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์รวม 411 ราย มีผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ 401 ราย

ในปี พ.ศ.2535 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์ 1,112 ราย ได้รับรายงานผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ 1,124 ราย

ในปี พ.ศ.2536 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์ 243 ราย ได้รับรายงานผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ 235 ราย

#### ผู้ป่วยโรคเอดส์

ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากยอดครั้งที่แล้ว 196 ราย แยกเป็นผู้ป่วยปี พ.ศ.2534 1 ราย พ.ศ.2535 52 ราย ปี พ.ศ 2536 143 ราย รวมเป็นผู้ป่วยเอดส์ ทั้งสิ้น 1,878 ราย รายงานเพิ่มเติมได้รับจาก 37 จังหวัด แยกเป็นจังหวัดทางภาคเหนือ 94 ราย ภาคกลาง 65 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 ราย และภาคใต้ 10 ราย ผู้ป่วยเอดส์ที่รายงานในรอบนี้ เป็นเพศชาย 159 ราย รวมเป็น 1,639 ราย เพศหญิง 37 ราย รวมเป็น 239 ราย

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มที่ติดต่อกับการมีเพศสัมพันธ์ 119 ราย ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 22 ราย ทารกติดเชื้อจากมารดา 25 ราย รับเลือด 1 ราย และไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง 29 ราย ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มติดต่อกับการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 75.5 (1,417 ราย) แยกเป็นชายรักต่างเพศ ร้อยละ 65.9 (1,238 ราย) หญิงรักต่างเพศร้อยละ 7.4 (139 ราย)

ผู้ป่วยเอดส์ที่ยังคงมีชีวิต 1087 ราย เสียชีวิตไปแล้ว 791 ราย

#### ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์

ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากยอดครั้งที่แล้ว 183 ราย แยกเป็นผู้ป่วยในปี 2531-2534 10 ราย พ.ศ.2535 45 ราย และปี พ.ศ 2536 128 ราย รวมเป็นผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ทั้งสิ้น 2,129 ราย โดยได้รับรายงานจาก 38 จังหวัด แยกเป็นภาคเหนือ 102 ราย ภาคกลาง 38 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ราย และภาคใต้ 19 ราย

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้น เป็นกลุ่มที่ติดต่อกับการมีเพศสัมพันธ์ 131 ราย ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 24 ราย และไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง 28 ราย