

สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ ประจำวัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2536

กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในปี พ.ศ. 2527 กองระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์ 1 ราย และในปีต่อมา จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งหมด 1,569 ราย เป็นผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ รวม 1,847 ราย

ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์รวม 410 ราย มีผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ 397 ราย

ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์ 1,015 ราย ได้รับรายงานผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์

ในปี พ.ศ. 2536 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์ 32 ราย ได้รับรายงานผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์

ผู้ป่วยโรคเอดส์

ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากยอดครั้งที่แล้ว 180 ราย แยกเป็นผู้ป่วยปี พ.ศ. 2534 2 ราย พ.ศ. 2535

146 ราย ปี พ.ศ. 2536 32 ราย รวมเป็นผู้ป่วยเอดส์ ทั้งสิ้น 1,569 ราย รายงานเพิ่มเติมได้รับจาก 35 จังหวัด

แยกเป็นจังหวัดทางภาคเหนือ 80 ราย ภาคกลาง 64 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 ราย และภาคใต้ 8 ราย

ผู้ป่วยเอดส์ที่รายงานในรอบนี้ เป็นเพศชาย 168 ราย รวมเป็น 1,379 ราย เพศหญิง 12 ราย รวมเป็น 190 ราย

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มที่ติดต่อกจากการมีเพศสัมพันธ์ 132 ราย ติดยาเสพติด

ชนิดฉีดเข้าเส้น 10 ราย ทารกติดเชื้อจากมารดา 5 ราย และไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง 24 ราย ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยเอดส์

ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มติดต่อกจากการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 77.9 (1,220 ราย) แยกเป็นชายรักต่างเพศ ร้อยละ 68.3

(1,070 ราย) หญิงรักต่างเพศร้อยละ 7.1 (110 ราย)

ผู้ป่วยเอดส์ยังคงมีชีวิต 879 ราย เสียชีวิตไปแล้ว 690 ราย

ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์

ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากยอดครั้งที่แล้ว 189 ราย แยกเป็นผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2534 เปลี่ยนเป็นผู้ป่วยเอดส์

1 ราย พ.ศ. 2535 155 ราย และปี พ.ศ. 2536 35 ราย รวมเป็นผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ทั้งสิ้น 1,847 ราย

โดยได้รับรายงานจาก 36 จังหวัด แยกเป็นภาคเหนือ 114 ราย ภาคกลาง 51 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ราย

และภาคใต้ 8 ราย

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้น เป็นกลุ่มที่ติดต่อกจากการมีเพศสัมพันธ์ 148 ราย ยาเสพติด

ชนิดฉีดเข้าเส้น 22 ราย ทารกติดเชื้อจากมารดา 4 ราย และไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง 15 ราย

ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มติดต่อกจากการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 77.6 (1,433 ราย) เป็นประเภทชาย

รักต่างเพศ ร้อยละ 64.0 (1,182 ราย) หญิงรักต่างเพศ ร้อยละ 11.0 (215 ราย) กลุ่มทารกที่ติดเชื้อจากมารดา

ร้อยละ 3.7 (48 ราย) ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 14.8 (273 ราย) ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ส่วนใหญ่ยังคงมี

ชีวิตอยู่ 1,588 ราย ที่เสียชีวิตไปแล้ว 259 ราย

หมายเหตุ 1. ได้ยกเลิกการรายงานผู้ติดเชื้อเอดส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2

(พ.ศ. 2534) ลงวันที่ 4 กันยายน 2534 เรื่อง ชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญ

2. กองระบาดวิทยาทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อแก้ไขรายงานตามที่ตั้งงานสาธารณสุข

จังหวัดแต่ละแห่งแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานผู้ป่วยตามบัตร 507/1