

สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2536

กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในปี พ.ศ.2527 กองระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์ 1 ราย และในปีต่อมา จนถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2536 ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งหมด 1,682 ราย เป็นผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ รวม 1,946 ราย

ในปี พ.ศ.2534 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์รวม 410 ราย มีผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ 396 ราย

ในปี พ.ศ.2535 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์ 1,060 ราย ได้รับรายงานผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ 1,079 ราย

ในปี พ.ศ.2536 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์ 100 ราย ได้รับรายงานผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ 107 ราย

ผู้ป่วยโรคเอดส์

ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากยอดครั้งที่แล้ว 113 ราย แยกเป็นผู้ป่วยปี พ.ศ.2535 45 ราย ปี พ.ศ. 2536 68 ราย รวมเป็นผู้ป่วยเอดส์ ทั้งสิ้น 1,682 ราย รายงานเพิ่มเติมได้จาก 33 จังหวัด แยกเป็นจังหวัดทางภาคเหนือ 64 ราย ภาคกลาง 39 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ราย และภาคใต้ 2 ราย ผู้ป่วยเอดส์ที่รายงานในรอบนี้ เป็นเพศชาย 101 ราย รวมเป็น 1,480 ราย เพศหญิง 12 ราย รวมเป็น 202 ราย

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ 78 ราย ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 8 ราย ทารกติดเชื้อจากมารดา 7 ราย และไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง 20 ราย ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 77.2 (1,298 ราย) แยกเป็นชายรักต่างเพศ ร้อยละ 67.8 (1,140 ราย) หญิงรักต่างเพศร้อยละ 7.0 (118 ราย)

ผู้ป่วยเอดส์ยังคงมีชีวิต 944 ราย เสียชีวิตไปแล้ว 738 ราย

ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์

ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากยอดครั้งที่แล้ว 99 ราย แยกเป็นผู้ป่วยในปี พ.ศ.2535 28 ราย และ ปี พ.ศ. 2536 72 ราย รวมเป็นผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ทั้งสิ้น 1,946 ราย โดยได้รับรายงานจาก 26 จังหวัด แยกเป็นภาคเหนือ 69 ราย ภาคกลาง 17 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ราย และภาคใต้ 5 ราย

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้น เป็นกลุ่มที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ 76 ราย ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 11 ราย และไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง 12 ราย

ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 77.5 (1,509 ราย) แยกเป็นประเภทชายรักต่างเพศ ร้อยละ 64.1 (1,247 ราย) หญิงรักต่างเพศ ร้อยละ 11.6 (226 ราย) กลุ่มทารกที่ติดเชื้อจากมารดาร้อยละ 3.5 (68 ราย) ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 14.6 (284 ราย) ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ส่วนใหญ่ยังคงมีชีวิตอยู่ 1,671 ราย ที่เสียชีวิตไปแล้ว 275 ราย

- หมายเหตุ
1. ได้ยกเลิกการรายงานผู้ติดเชื้อเอดส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2534) ลงวันที่ 4 กันยายน 2534 เรื่อง ชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญ
 2. กองระบาดวิทยาทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อแก้ไขรายงานตามคำสั่งงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละแห่งแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานผู้ป่วยตามบัตร 507/1