

สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ ประจำวันที 31 กรกฎาคม 2536

กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

นับจากที่ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา กองระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์ รายต่อ ๆ มาในปีถัดไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2536 ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งหมด 2,533 ราย และผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ รวมทั้งหมด 2,490 ราย

ในปี พ.ศ.2535 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์ 1,213 ราย ได้รับรายงานผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ 1,153 ราย

ในปี พ.ศ.2536 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์ 786 ราย ได้รับรายงานผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ 562 ราย

ผู้ป่วยโรคเอดส์

ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากยอดครั้งที่แล้ว 273 ราย แยกเป็นผู้ป่วยปี พ.ศ 2533 3 ราย ปี พ.ศ 2534 6 ราย ปี พ.ศ.2535 63 ราย ปี พ.ศ 2536 201 ราย รวมเป็นผู้ป่วยเอดส์ทั้งสิ้น 2,533 ราย รายงานเพิ่มเติมได้รับจาก 50 จังหวัด แยกเป็นจังหวัดทางภาคเหนือ 119 ราย ภาคกลาง 117 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 ราย และภาคใต้ 8 ราย ผู้ป่วยเอดส์ที่รายงานในรอบเดือนนี้เป็นเพศชาย 240 ราย รวมเป็น 2,219 ราย เพศหญิง 33 ราย รวมเป็น 314 ราย

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ 226 ราย ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 20 ราย ทารกติดเชื้อจากมารดา 18 ราย รับเลือด 2 ราย และไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง 7 ราย ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 76.4 (1,935 ราย) แยกเป็นชายรักต่างเพศ ร้อยละ 67.1 (1,700 ราย) หญิงรักต่างเพศร้อยละ 7.7 (195 ราย) ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ร้อยละ 9.0 (228 ราย) ทารกติดเชื้อจากมารดา ร้อยละ 8.8 (222 ราย)

ผู้ป่วยเอดส์ยังคงมีชีวิต 1,542 ราย เสียชีวิตไปแล้ว 991 ราย

ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์

ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากยอดครั้งที่แล้ว 159 ราย เป็นผู้ป่วยที่ป่วยในปี พ.ศ. 2533 2 ราย ปี พ.ศ 2534 3 ราย ปี พ.ศ 2535 18 ราย ปี พ.ศ 2536 136 ราย รวมเป็นผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ทั้งสิ้น 2,490 ราย โดยได้รับรายงานจาก 39 จังหวัด แยกเป็นภาคเหนือ 93 ราย ภาคกลาง 33 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 ราย และภาคใต้ 10 ราย

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้น เป็นกลุ่มที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ 130 ราย ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 13 ราย และไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง 16 ราย

ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 77.6 (1,931 ราย) แยกเป็นประเภทชายรักต่างเพศ ร้อยละ 64.2 (1,599 ราย) หญิงรักต่างเพศร้อยละ 11.9 (296 ราย) ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 13.7 (340 ราย) ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ส่วนใหญ่ยังคงมีชีวิตอยู่ 2,128 ราย ที่เสียชีวิตไปแล้ว 362 ราย

หมายเหตุ ได้ยกเลิกการรายงานผู้ติดเชื้อเอดส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ 2534) ลงวันที่ 4 กันยายน 2534 เรื่อง ชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญ