

เอกสารอ้างอิง

1. นพ.ธนา ประมุขกุล และคณะ รายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี (เอกสารโรเนียว)
2. Benjamin E. Hodge. Control of Staphylococcal food poisoning Public Health Reports. 1960; 75, No 4, 355-361

สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ ประจำวันที่ 30 กันยายน 2536

กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

จากระบบการเฝ้าระวังโดยการรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ นับตั้งแต่มีรายงานผู้ป่วยรายแรกในปี พ.ศ.2527 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2536 กองระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยรวมยอดสะสม ดังนี้

ผู้ป่วยเอดส์ทั้งสิ้น 3436 ราย แยกเป็นเพศชาย 2998 ราย เพศหญิง 438 ราย คิดเป็นอัตราส่วน เพศชาย : เพศหญิง เท่ากับ 6.8 ต่อ 1 ผู้ป่วยที่รายงานเข้ามาทั้งหมดนี้เสียชีวิตไปแล้ว 1260 ราย (คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 36.6) ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2176 ราย

ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ มีทั้งสิ้น 2688 ราย แยกเป็นเพศชาย 2289 ราย เพศหญิง 399 ราย คิดเป็นอัตราส่วน เพศชาย : เพศหญิง เท่ากับ 5.7 ต่อ 1 ผู้ป่วยที่รายงานเข้ามาทั้งหมดนี้เสียชีวิตไปแล้ว 383 ราย (คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 14.2) ยังมีชีวิตอยู่ 2305 ราย

ผู้ป่วยโรคเอดส์

ในเดือนกันยายนได้รับรายงานเพิ่มจากทั่วประเทศ รวม 435 ราย แยกเป็นผู้ป่วยที่รายงานย้อนหลังปี พ.ศ.2535 15 ราย และปี พ.ศ.2536 420 ราย รวมเป็นผู้ป่วยในปี พ.ศ.2535 1277 ราย และปี พ.ศ.2536 1618 ราย ตามลำดับ (ตารางที่ 1)

รายงานที่ได้รับเพิ่มเติมมาจาก 48 จังหวัด แยกเป็นจังหวัดภาคเหนือ 289 ราย ภาคกลาง 83 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45 ราย และภาคใต้ 18 ราย รวมเป็นผู้ป่วยสะสมจากภาคเหนือ 1989 ราย ภาคกลาง 982 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 337 ราย และภาคใต้ 128 ราย

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่มีรายงานเพิ่ม 435 ราย นั้น แยกเป็นกลุ่มที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ 336 ราย ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 37 ราย ทารกที่ติดเชื้อจากมารดา 18 ราย และไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง 44 ราย

(อ่านต่อหน้า 585)