

โรคหัด (Measles)

ในปี พ.ศ. 2535 มีรายงานผู้ป่วยโรคหัดทั่วประเทศ รวม 7,892 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 13.66 ต่อประชากรแสนคน พิจารณาแนวโน้มของโรคนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 พบว่า อัตราป่วยสูงขึ้นเป็นลำดับ และสูงสุดในปี 2527 จากนั้นอัตราป่วยเริ่มลดลงในปี พ.ศ. 2528 - 2529 ในปี 2530 อัตราป่วยเพิ่มขึ้นอีกครั้งและเริ่มลดลงในปี พ.ศ. 2531 และลดลงต่ำสุดในปี 2532 ส่วนปี พ.ศ. 2533 อัตราป่วยสูงขึ้น อีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2534 อัตราป่วยเริ่มลดลงจากปี 2533 เล็กน้อย และปี 2535 นี้ อัตราป่วยลดลงจากปี พ.ศ. 2534 มากอย่างเห็นได้ชัด ลดลงมามากกว่าทุกปีที่ผ่านมา (รูปที่ 1) ที่สำคัญคือ ไม่มีผู้ป่วยตายจากโรค Measles ในปี 2535 นี้เลย

การเกิดโรคพบกระจายตลอดทั้งปี แต่จะพบผู้ป่วยสูงมากในช่วงต้นปี ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน ส่วนปลายปี จำนวนผู้ป่วยลดลง (รูปที่ 2)


พบผู้ป่วยทั้งสองเพศและในทุกกลุ่มอายุ โดยมีอัตราส่วน เพศชาย : เพศหญิง เท่ากับ 1.13 : 1 (4,179 : 3,713) กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วย 47.90 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี ซึ่งมีอัตราป่วย 45.83 และ 22.33 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ลักษณะการกระจายตามกลุ่มอายุ ในช่วง 3 ปีหลัง (พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535) เปลี่ยนจากเดิม ซึ่งพบว่า กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดมาตลอด เป็นกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (รูปที่ 3)

พิจารณาอัตราป่วยตามรายภาค พบว่า ภาคใต้ มีอัตราป่วยสูงสุด 19.50 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งมีอัตราป่วย 14.62, 12.98 และ 11.46 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ โดยมีอัตราป่วยทุกภาคต่ำกว่า ปี 2534 อย่างเห็นได้ชัด (รูปที่ 4)


จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดนครพนม อัตราป่วย 104.93 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดพิจิตร (71.86) สมุทรสงคราม (63.37) กระบี่ (45.61) ยะลา (41.81) แม่ฮ่องสอน (34.81) และจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่ำสุดคือ จังหวัดลำปาง อัตราป่วย 2.19 ต่อประชากรแสนคน (รูปที่ 5)

จำนวนผู้ป่วยโรคหัดที่มีอาการแทรกซ้อน จำนวน 553 ราย พบว่า ส่วนใหญ่มีอาการแทรกซ้อนเนื่องจากโรคปอดบวม จำนวน 306 ราย (55.33 %) รองลงมาคือ โรคอุจจาระร่วง จำนวน 102 ราย (18.44 %) ใช้สมองอีกเสบ 4 ราย (0.72 %) โรคปอดบวมร่วมกับอุจจาระร่วง 3 ราย (0.54 %) อื่น ๆ 46 ราย (8.32 %) ไม่ทราบ 88 ราย (15.91%)


รูปที่ 1 Reported Cases of Measles Per 100,000 Population by Year, Thailand 1983-1992.




รูปที่ 2 Reported Cases of Measles by Month, Thailand 1988-1992.




รูปที่ 3 Reported Cases of Measles Per 100,000 Population by Age-Group, Thailand 1988-1992.



รูปที่ 4 Reported Cases of Measles Per 100,000 Population by Region, Thailand 1988-1992.



รูปที่ 5 Reported Cases of Measles Per 100,000 Population
by Province, Thailand 1992.



รายงานโดย แพทย์โครงการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา
ฝ่ายประมวลผลและวิเคราะห์ กองระบาดวิทยา