

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย (ต่อจากหน้า 604)

- Ahia. "Compliance with Safer-Sex Guildlines Among Adolescent Males : Application of the Health Belief Model and Protection Motivation Theory." *Journal of Health Education*. (Vol.22,1991) : 49-52.
- Janz, N.K. and Becker, M.H. "The Health Belief Model a Decade Later." *Health Education Quarterly*. (Spring 1984) : 1-47.
- Rosenstock, Irwin M. "The Health Belief Model and Preventive Health Behavior." *Health Education Quarterly*. 2 (Winter 1974) : 284-386.

สถานการณ์โรคเอดส์ประเทศไทย

กองระบาดวิทยา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองระบาดวิทยา ได้รับรายงาน ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2540 พบว่า มีผู้ป่วยเอดส์ 70,013 ราย(รูปที่ 1) แยกเป็นเพศชาย 57,467 ราย เพศหญิง 12,546 รายคิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 4.6 : 1 เสียชีวิต 18,610 ราย

จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง พบว่า เพศสัมพันธ์ สูงที่สุด ร้อยละ 81.7 รองลงมา ยาเสพติดชนิดฉีด ร้อยละ 5.9 คิดเชื้อจากมารดา ร้อยละ 5.3 และรับเลือดร้อยละ 0.07 (ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงร้อยละ 7.1) ดังรูปที่ 2

กลุ่มอายุ พบว่า สัดส่วนที่พบมาก 5 อันดับแรก คือ กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี มีผู้ป่วยร้อยละ 28.7 รองลงมา กลุ่มอายุ 30-34 ปี ร้อยละ 22.7 กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี ร้อยละ 13.89 กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี ร้อยละ 13.2 และกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี ร้อยละ 5.0 อาชีพ พบว่า สัดส่วนที่พบมาก 5 อันดับแรก ในปี 2540 มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด ร้อยละ 47.0 รองลงมา เกษตรกรรม ร้อยละ 20.0 เด็กต่ำกว่าวัยเรียน ร้อยละ 4.8 , ค้าขาย ร้อยละ 4.3 และงานบ้านร้อยละ 3.6 ตามลำดับ ซึ่งอาชีพที่พบมาก 5 อันดับแรกคล้ายคลึงกับที่ได้รับรายงานในปีที่ผ่านมา

จังหวัดที่อยู่ปัจจุบันของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับรายงาน 5 อันดับแรก มีดังนี้ เชียงใหม่ จำนวน 8,375 ราย กทม. 7,013 ราย เชียงราย 6,952 ราย ,พะเยา 4,007 รายและลำปาง 3,248 ราย

โรคติดเชื้อฉวยโอกาส 5 อันดับแรก คือ Wasting syndrome 18,803 ราย , รองลงมา Mycobacterium tuberculosis ,Pulmonary or extrapulmonary 17,361 ราย ,โรคปอดบวมจากเชื้อ Pneumocystis carinii 12,118 ราย, Cryptococcosis 11,511 ราย และ Candidiasis ของหลอดอาหาร หลอดลม หรือปอด 4,388

รายงานที่ได้รับ ตั้งแต่ พ.ศ.2527 - 30 กันยายน 2540

ประเภท	2540	2539	2538	2527-37	รวมสะสม
ผู้ป่วยเอดส์	7,445	20,766	19,405	22,397	70,013
ผู้ติดเชื้อเอดส์	3,387	8,809	7,982	8,899	29,077
ที่มีอาการ					


รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ จำนวนรายปี ตามวันเริ่มป่วย

ประเทศไทย พ.ศ.2527 - 30 กันยายน 2540




รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยเอดส์จำนวนตามปัจจัยเสี่ยง

ระหว่าง พ.ศ. 2527 - 30 กันยายน 2540



รูปที่ 3 จำนวนผู้ป่วยเอดส์จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ
ระหว่าง พ.ศ.2527 ถึง 30 กันยายน 2540



WWW.MOHP.GOV.TH

กระทรวงสาธารณสุข

1. ศึกษาและประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา
2. ศึกษาและประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์ในสถานประกอบการ
3. ศึกษาและประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์ในสถานบริการ
4. ศึกษาและประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์ในสถานชุมชน

จำนวนผู้ป่วย

Ministry of Public Health, Thailand Road, Nonthaburi 11000, Thailand, Tel. 2601723, 2601725
 Division of Epidemiology, Office of the Director General
 11000, Thailand, Tel. 2601723, 2601725

กระทรวงสาธารณสุข
 กองระบาดวิทยา
 โทร. 2601723, 2601725

หน้า 615 จาก 615

(นายแพทย์ สาธิตานันท์)
 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค