

สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ประเทศไทย

กองระบาดวิทยา ได้รับรายงานจากสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2540 พบว่า มีผู้ป่วยเอดส์ 72,775 ราย และเพิ่มขึ้นทุกปี (รูปที่ 1) เมื่อนำมาทำการแจกแจงตามบุคคล สถานที่ สรุปได้ดังนี้

เพศ เพศชาย 59,548 ราย หญิง 13,227 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 4.5 : 1 พบว่า เพศชายป่วยมากกว่าเพศหญิงทุกกลุ่มอายุ (รูปที่ 2)

กลุ่มอายุ ที่พบมากเป็นกลุ่มวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20 - 39 ปี รองลงมาเป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 0 - 4 ปี (กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี ร้อยละ 28.7 สูงที่สุด รองลงมา 30 - 34 ปี ร้อยละ 22.8 , 35 - 39 ปี ร้อยละ 13.9, 20 - 24 ปี ร้อยละ 13.1 และ 0 - 4 ปี ร้อยละ 5.0)

อาชีพ ข้อมูลหลาย ๆ ปี บ่งชี้ว่า ผู้ป่วยเอดส์ มีอาชีพรับจ้างมากที่สุด รองลงมา เกษตรกรรม , เด็กต่ำกว่าวัยเรียน และงานบ้าน (ปี พ.ศ. 2540 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 45.4 รองลงมา เกษตรกรรม ร้อยละ 20.4 , เด็กต่ำกว่าวัยเรียน ร้อยละ 4.8 , ค้าขาย ร้อยละ 4.2 และงานบ้าน ร้อยละ 3.6)

ปัจจัยเสี่ยง เพศสัมพันธ์ ส่วนมากเป็นรักต่างเพศสูงที่สุด รองลงมา ยาเสพติดชนิดฉีด ดินเชื้อจากมารดา และรับเลือด (ร้อยละ 81.8 , 5.8 , 5.3 และ 0.06 ตามลำดับ)

ที่อยู่ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ ผู้ป่วยมีที่อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน (จังหวัดที่ได้รับรายงาน 5 อันดับแรก คือ เชียงใหม่ จำนวน 8,587 ราย , เชียงราย 7,277 ราย , กรุงเทพมหานคร 7,263 ราย , พะเยา 4,234 ราย และ ลำปาง 3,426 ราย)

การเสียชีวิต ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต จำนวน 19,265 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.5 ของผู้ป่วยที่ได้รับรายงานเพศชายเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิง อย่างไรก็ตาม รายงานการเสียชีวิตยังต่ำกว่าความเป็นจริง


โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ที่ได้รับรายงานมากที่สุด คือ Wasting syndrome 19,474 ราย , รองลงมา Mycobacterium tuberculosis Pulmonary or extrapulmonary 18,107 ราย , โรคปอดบวมจากเชื้อ Pneumocystis carinii 12,668 ราย Cryptococcosis 12,007 ราย และ Candidiasis ของหลอดอาหาร หลอดลม หรือปอด 4,496 รายตามลำดับ

ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ ได้รับรายงาน จำนวน 30,406 ราย เป็นเพศชาย 23,691 ราย เพศหญิง 6,715 ราย อัตราส่วนชายต่อหญิง เท่ากับ 35 : 1 เสียชีวิต 3,140 ราย

จังหวัดที่กองระบาดวิทยา ไม่ได้รับรายงานในเดือนตุลาคม 2540 จำนวน 17 จังหวัด ดังนี้ อุบลราชธานี ศรีสะเกษหนองบัวลำภู มุกดาหาร สมุทรปราการ สิงห์บุรี ชัยนาท สระแก้ว นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เชียงราย แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร ตาก พิจิตร ยะลา และ นราธิวาส


รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ จำแนกรายปี ตามวันเริ่มป่วย

ประเทศไทย พ.ศ.2527 - 31 ตุลาคม 2540



รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยเอดส์จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ

ระหว่าง พ.ศ.2527 ถึง 31 ตุลาคม 2540



แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคเอดส์ กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข