

สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540

กองระบาดวิทยา ได้รับรายงานจากสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 พบว่า มีผู้ป่วยเอดส์ 76,859 ราย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และมีผู้เสียชีวิต 20,337 ราย (รูปที่ 1) เมื่อนำมาทำการแจกแจงตามบุคคลสถานที่ สรุปได้ดังนี้

เพศ เพศชาย 62,764 ราย หญิง 14,095 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 4.4 : 1

กลุ่มอายุ ที่พบมาก เป็นกลุ่มวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20 - 39 ปี (กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี ร้อยละ 28.7 สูงที่สุด

รองลงมา 30 - 34 ปี ร้อยละ 22.8 , 35 - 39 ปี ร้อยละ 13.9 , อายุ 20 - 34 ปี ร้อยละ 12.9) ส่วนผู้ป่วยที่มีอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.9

อาชีพ พบว่า อาชีพรับจ้างมากที่สุด รองลงมา คือ เกษตรกรรม , ค้าขาย , งานบ้านและรับราชการ (รับจ้าง ร้อยละ 42.4 , เกษตรกรรม ร้อยละ 21.8 , ค้าขาย ร้อยละ 4.35 , งานบ้าน ร้อยละ 2.85 และรับราชการ ร้อยละ 2.84)

ปัจจัยเสี่ยง เพศสัมพันธ์สูงสุด รองลงมา ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น , ติดเชื้อจากมารดาและ รับเลือด

(ร้อยละ 82.1, 5.6 , 5.2 และ 0.06 ตามลำดับ) สำหรับเพศสัมพันธ์ พบว่า มีพฤติกรรมแบบชายรักร่วมเพศ ร้อยละ 0.8 เท่านั้น

ที่อยู่ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2540 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ พะเยา รองลงมา ระนอง , เชียงราย , ระยองและลำปาง อัตราป่วยต่อแสนประชากร เท่ากับ 176.7 , 109.9, 90.5 , 90.0 และ 86.4 ตามลำดับ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดในปี พ.ศ. 2540 คือ ภาคเหนือ รองลงมา ภาคกลาง ภาคใต้ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อัตราป่วยต่อแสนประชากร เท่ากับ 42.0 , 28.0 , 15.7 และ 8.0 ตามลำดับ)


จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในแต่ละภาคของปี พ.ศ. 2540 มีดังนี้ ภาคเหนือ จังหวัด พะเยา (อัตราป่วย 176.7 ต่อแสนประชากร) ภาคกลาง จังหวัดระยอง (อัตราป่วย 90.0 ต่อแสนประชากร) ภาคใต้ จังหวัด ระนอง (อัตราป่วย 109.9 ต่อแสนประชากร) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด เลย (อัตราป่วย 22.0 ต่อแสนประชากร)

โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ที่ได้รับรายงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ Mycobacterium tuberculosis Pulmonary or extrapulmonary 19,300 ราย รองลงมาโรคปอดบวมจากเชื้อ *Pneumocystis carinii* 13,452 ราย *Cryptococcosis* 12,754 ราย *Candidiasis* ของหลอดอาหาร หลอดลม หรือปอด 4,631 ราย และ Pneumonia recurrent (Bacteria) มากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี จำนวน 2,960 ราย ตามลำดับ

ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ ได้รับรายงาน จำนวน 31,941 ราย เป็นเพศชาย 24,807 ราย เพศหญิง 7,134 ราย อัตราส่วนชายต่อหญิง เท่ากับ 3.5 : 1 เสียชีวิต 3,297 ราย (รูปที่ 2) กลุ่มอาการที่พบมากที่สุด คือ Wasting syndrome จำนวน 20,491 ราย

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยเอดส์และเสียชีวิต จำแนกรายปี ตามวันเริ่มป่วย

ประเทศไทย พ.ศ. 2527 - 31 ธันวาคม 2540



รูปที่ 2 จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการและผู้เสียชีวิต จำแนกรายปีตามวันเริ่มป่วย

ประเทศไทย พ.ศ. 2527 - 31 ธันวาคม 2540

