

การเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแอเฉียบพลัน  
( Acute Flaccid Paralysis : AFP )

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วย AFP ในแต่ละเขตสาธารณสุขจําแนกตามรายเดือน  
ประเทศไทย พ.ศ. 2541

ZONE	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Bangkok	0	1	0	0									1
Zone 1	0	0	1	0									1
Zone 2	0	2	0	3									5
Zone 3	0	3	0	0									3
Zone 4	2	0	0	0									2
Zone 5	2	2	0	0									4
Zone 6	3	1	2	0									6
Zone 7	0	0	1	1									2
Zone 8	0	0	0	0									0
Zone 9	1	3	0	1									5
Zone 10	2	3	2	1									8
Zone 11	2	1	1	0									4
Zone 12	0	0	0	2									2
Total	12	16	7	8									43

ข้อมูลในตารางที่ 1 เป็นจำนวนผู้ป่วย AFP ที่กองระบาดวิทยารวบรวมได้จาก รง. 506 และจากกรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วย AFP ในแต่ละเขตสาธารณสุข จำแนกตามเครื่องชี้วัดทางระบาดวิทยา  
ประเทศไทย พ.ศ. 2541

Zone	1998								
	# AFP Cases	AFP						Specimens	
		Case Classification				AFP Rate		Collection	
		Polio		Discarded (non-polio AFP)	Pending	total AFP rate	non-polio AFP rate	% with 2 spec. within 14 days	% with any specimen
Total	Wild poliovirus								
Bangkok	1	0	0	0	1	0.1	0.0	0	100
Zone 1	1	0	0	1	0	0.1	0.1	0	100
Zone 2	5	0	0	2	3	0.7	0.3	100	100
Zone 3	3	0	0	0	3	0.4	0.0	67	100
Zone 4	2	0	0	1	1	0.3	0.1	50	100
Zone 5	4	0	0	2	2	0.2	0.1	75	75
Zone 6	6	2	0	2	2	0.4	0.1	67	100
Zone 7	2	0	0	1	1	0.1	0.1	0	100
Zone 8	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
Zone 9	5	1	0	1	3	0.5	0.1	80	100
Zone 10	8	0	0	4	4	0.8	0.4	88	100
Zone 11	4	0	0	1	3	0.4	0.1	75	100
Zone 12	2	0	0	0	2	0.2	0.0	50	100
TOTAL	43	3	0	15	25	0.3	0.1	70	98

Zone	เท่ากับ	เขตสาธารณสุข
# AFP cases	เท่ากับ	จำนวนผู้ป่วย AFP ทั้งหมด
Case classification	เท่ากับ	ประเภทของผู้ป่วย AFP
Discarded	เท่ากับ	ผู้ป่วย AFP ที่ไม่ใช่โปลิโอ
Wild poliovirus	เท่ากับ	ผู้ป่วย AFP ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสธรรมชาติจากอุจจาระ
Pending	เท่ากับ	ผู้ป่วย AFP ที่กำลังรอผล
total AFP rate	เท่ากับ	อัตราป่วยด้วย AFP ทั้งหมดต่อประชากรแสนคนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
non-polio AFP rate	เท่ากับ	อัตราป่วยด้วย AFP ต่อประชากรแสนคนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
% with 2 spec. within 14 days	เท่ากับ	% ของอุจจาระที่ส่งตรวจภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการอัมพาต
% with any specimens	เท่ากับ	% ของอุจจาระที่ส่งตรวจทั้งหมด