

รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 5-6 พ.ศ. 2568

Summary Reports of Epidemiological Surveillance in Week 5-6, 2025

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Intelligence and Non-Communicable Diseases Surveillance Development Unit, Division of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health

✉ ncddoe@ddc.mail.go.th

กรมควบคุมโรค ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคโดยมีการรวบรวมรายงานโรคจากเครือข่ายสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) กรมควบคุมโรค (<https://ddssoe.ddc.moph.go.th/ddss/>) รายละเอียดดังนี้

1) ความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูล (26 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2568)



การรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลในระดับประเทศ พบความครอบคลุมในการรายงาน 89.92% (สถานพยาบาลที่รายงานข้อมูล 1,275 แห่ง จากสถานพยาบาลทั้งหมด 1,418 แห่ง) ความทันเวลาในการรายงาน 91.90% (รายงานมีความทันเวลา 39,111 รายงานจาก 101,321 รายงาน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 70% และ 80% ตามลำดับ

การรายงานข้อมูลในระดับเขตสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่ (12 จาก 13 เขต) มีผลการดำเนินงานด้านความครอบคลุมและความทันเวลาสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 5-6 พ.ศ. 2568 (26 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2568)

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	ความครอบคลุม	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความทันเวลา
เขตสุขภาพที่ 1	129	139	92.81%	15,476	16,596	93.25%
เขตสุขภาพที่ 2	59	64	92.19%	3,788	4,133	91.65%
เขตสุขภาพที่ 3	68	71	95.77%	2,578	2,920	88.29%
เขตสุขภาพที่ 4	111	116	95.69%	6,772	6,997	96.78%
เขตสุขภาพที่ 5	97	110	88.18%	6,198	7,163	86.53%
เขตสุขภาพที่ 6	135	143	94.41%	8,929	9,724	91.82%
เขตสุขภาพที่ 7	85	91	93.41%	6,858	7,424	92.38%
เขตสุขภาพที่ 8	102	103	99.03%	4,453	4,616	96.47%
เขตสุขภาพที่ 9	102	106	96.23%	9,370	10,018	93.53%
เขตสุขภาพที่ 10	81	90	90.00%	10,393	11,189	92.89%
เขตสุขภาพที่ 11	107	119	89.92%	7,094	7,580	93.59%
เขตสุขภาพที่ 12	95	100	95.00%	5,367	5,602	95.81%
เขตสุขภาพที่ 13	104	166	62.65%	5,841	7,365	79.31%

*ความครอบคลุม (%) หมายถึง สัดส่วนของสถานพยาบาลที่มีการรายงานโรคในระบบ DDS เมื่อเทียบกับจำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรายงานข้อมูลโรคในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 70% (ประเภทสถานพยาบาลที่ใช้ในการคำนวณความครอบคลุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน) *ความทันเวลา (%) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนรายงานที่ถูกรายงานเข้ามาในระบบ DDS ภายใน 7 วันหลังวินิจฉัย เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความทันเวลาของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 80%



รูปที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) รายจังหวัด สัปดาห์ที่ 5-6 พ.ศ. 2568 (26 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2568)

2) ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง สัปดาห์ที่ 5-6 พ.ศ. 2568 (26 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2568)

โรคที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ (40,472 ราย) รองลงมา คือ โรคปอดอักเสบ (22,700 ราย) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (20,940 ราย) โรคอาหารเป็นพิษ (7,988 ราย) และโรคสுகใส (2,445 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) สูง ได้แก่ โรคปอดอักเสบ (6,436 ราย) โรคไข้หวัดใหญ่ (5,634 ราย) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (2,025 ราย) โรคไข้เด็งกีทั้งหมด (488 ราย) และโรคอาหารเป็นพิษ (411 ราย)

โรคที่มีอัตราป่วยตายสูง ได้แก่ โรคเมลิออยโดสิส (2.15%) โรคไข้เด็งกีทั้งหมด (0.36%) โรคปอดอักเสบ (0.08%) และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (0.07%)

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนผู้เสียชีวิต และอัตราป่วยตาย ของโรคที่รายงานในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) สัปดาห์ที่ 5-6 พ.ศ. 2568 (26 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2568)

กลุ่มโรค	โรค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
กลุ่มโรคติดเชื้อจากการสัมผัส	โรคมือเท้าปาก	1,666	133	0	0.00
	โรคเมลิออยโดสิส	93	33	2	2.15
	ไข้เอนเทอโรไวรัส	17	7	0	0.00
	โรคเรื้อน	0	0	0	0.00
กลุ่มโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง	ไข้เด็งกีทั้งหมด	1,103	488	4	0.36
	โรคสครับไทฟัส	260	60	0	0.00
	ไข้มาลาเรีย	45	18	0	0.00
	ไข้ปวดข้อยุงลาย	7	1	0	0.00
	โรคติดเชื้อไวรัสชิคา	3	2	0	0.00
กลุ่มโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	โรคสுகใสหรือโรคอีสุกอีใส	2,445	47	0	0.00
	ไข้หัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	47	20	0	0.00
	ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน	12	4	0	0.00
	โรคไอกรน	19	14	0	0.00
	ไข้หัดเยอรมัน, ไข้หัดเยอรมันที่มีโรคแทรกซ้อน	2	1	0	0.00
	ไข้สมองอักเสบเจแปนนิส	0	0	0	0.00
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	ไข้หวัดใหญ่	40,472	5,634	2	0.00
	โรคปอดอักเสบหรือโรคปอดบวม	22,700	6,436	19	0.08
	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	1,513	145	1	0.07
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง	เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีได้ระบุรายละเอียด	66	22	0	0.00
	ไข้สมองอักเสบ	46	11	0	0.00
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	โรคซิฟิลิส, โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด	1,199	34	0	0.08
	โรคหนองใน	628	5	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด บี	755	28	0	0.00
	โรคหูดอวยวะเพศและทวารหนัก	395	5	0	0.00
	โรคเริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก	225	3	0	0.00
	โรคหนองในเทียม	82	1	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด ซี	104	7	0	0.00
	โรคแผลริมอ่อน	61	2	0	0.00

กลุ่มโรค	โรค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
	กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	8	0	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด ดี	5	0	0	0.00
กลุ่มโรคระบบทางเดิน อาหารและน้ำ	อาหารเป็นพิษ	7,988	411	0	0.00
	โรคบิดมีตัวหรือโรคบิดจากเชื้ออะมีบา	87	11	0	0.00
	ใช้รากสาดน้อย, ใช้ไทฟอยด์	107	32	0	0.00
	พยาธิใบไม้ในตับ	167	0	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด เอ	42	12	0	0.00
	ใช้รากสาดเทียม, ใช้พาราไทฟอยด์	4	1	0	0.00
	โรคบิดจากเชื้อซิเกลลา	18	1	0	0.00
	โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด	9	5	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด อี	2	1	0	0.00
	โรคเลปโตสไปโรซิส	103	40	0	0.00
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส	15	11	0	0.00
	โรคบรูเซลเลซิส	5	1	0	0.00

3) สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง


โรคเมลิออยโดสิส

- โรคเมลิออยโดสิสเป็นโรคที่มีอัตราป่วยตายสูงสุด ในสัปดาห์ที่ 5-6 พ.ศ. 2568 (12-25 มกราคม 2568) มีรายงานผู้ป่วย 93 ราย อัตราป่วย 0.14 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย อัตราตาย 0.003 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายร้อยละ 2.15
- กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 60 ปีขึ้นไป (อัตราป่วย 0.30 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 50-59 ปี (0.23) และ 40-49 ปี (0.16) ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่รักษาในแผนกผู้ป่วยนอก (64.51%)
- อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนมากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 10 รองลงมา คือ เขตสุขภาพที่ 7, เขตสุขภาพที่ 8 โดย 10 จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด ได้แก่ มุกดาหาร (0.86) ยโสธร (0.75) ลำปาง (0.70) กาฬสินธุ์ (0.62) อำนาจเจริญ (0.53) บึงกาฬ (0.48) พิษณุโลก (0.48) หนองบัวลำภู (0.39) ร้อยเอ็ด (0.39) และอุดรธานี (0.39)


แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากระบบระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS)

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้เสียชีวิต อัตราตายต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายของโรคเมลิออยโดสิส จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 5-6 พ.ศ. 2568 (26 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2568)


เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	อัตราป่วยตาย (%)
เขตสุขภาพ 1	9	0.163	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 2	4	0.118	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 3	2	0.069	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 4	2	0.037	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 5	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 6	5	0.081	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 7	18	0.361	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 8	13	0.237	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 9	15	0.224	2	0.03	13.333
เขตสุขภาพ 10	19	0.416	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 11	3	0.068	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 12	2	0.04	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 13	0	0	0	0	
ไม่ระบุ	1		0		0.000



รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคเมลิออยโดสิส (ต่อประชากรแสนคน) รายจังหวัด สัปดาห์ที่ 5-6 พ.ศ. 2568 (26 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2568)



รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคเมลิออยโดสิส (ต่อประชากรแสนคน) จำแนกตามกลุ่มอายุ สัปดาห์ที่ 5-6 พ.ศ. 2568 (26 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2568)



รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิส รายสัปดาห์ พ.ศ. 2568 เปรียบเทียบ พ.ศ. 2567 และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี