

รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 7-8 พ.ศ. 2568

Summary Reports of Epidemiological Surveillance in Week 7-8, 2025

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Intelligence and Non-Communicable Diseases Surveillance Development Unit, Division of Epidemiology,

Department of Disease Control, Ministry of Public Health

✉ ncddoe@ddc.mail.go.th

กรมควบคุมโรค ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคโดยมีการรวบรวมรายงานโรคจากเครือข่ายสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) กรมควบคุมโรค (<https://ddssdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>) รายละเอียดดังนี้

1) ความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูล (9-22 กุมภาพันธ์ 2568)



การรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลในระดับประเทศ พบความครอบคลุมในการรายงาน 89.96% (สถานพยาบาลที่รายงานข้อมูล 1,273 แห่ง จากสถานพยาบาลทั้งหมด 1,415 แห่ง) ความทันเวลาในการรายงาน 90.24% (รายงานมีความทันเวลา 109,267 รายงานจาก 121,083 รายงาน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 70% และ 80% ตามลำดับ

การรายงานข้อมูลในระดับเขตสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่ (12 จาก 13 เขต) มีผลการดำเนินงานด้านความครอบคลุมและความทันเวลาสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 7-8 พ.ศ. 2568 (9-22 กุมภาพันธ์ 2568)

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	ความครอบคลุม	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความทันเวลา
เขตสุขภาพที่ 1	132	139	94.96%	14,591	15,863	91.98%
เขตสุขภาพที่ 2	59	64	92.19%	5,198	5,697	91.24%
เขตสุขภาพที่ 3	69	71	97.18%	3,056	3,526	86.67%
เขตสุขภาพที่ 4	110	116	94.83%	9,218	9,966	92.49%
เขตสุขภาพที่ 5	98	110	89.09%	6,908	7,943	86.97%
เขตสุขภาพที่ 6	133	143	93.01%	11,038	13,986	78.92%
เขตสุขภาพที่ 7	86	91	94.51%	8,432	8,704	96.88%
เขตสุขภาพที่ 8	102	102	100.00%	5,999	6,141	97.69%
เขตสุขภาพที่ 9	103	106	97.17%	12,350	13,896	88.87%
เขตสุขภาพที่ 10	77	90	85.56%	11,754	11,990	98.03%
เขตสุขภาพที่ 11	109	119	91.60%	8,905	9,600	92.76%
เขตสุขภาพที่ 12	96	100	96.00%	6,373	7,238	88.05%
เขตสุขภาพที่ 13	99	164	60.37%	5,445	6,533	83.35%

*ความครอบคลุม (%) หมายถึง สัดส่วนของสถานพยาบาลที่มีการรายงานโรคในระบบ DDS เมื่อเทียบกับจำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรายงานข้อมูลโรคในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 70% (ประเภทสถานพยาบาลที่ใช้ในการคำนวณความครอบคลุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน) *ความทันเวลา (%) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนรายงานที่ถูกรายงานเข้ามาในระบบ DDS ภายใน 7 วันหลังวินิจฉัย เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความทันเวลาของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 80%



รูปที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) รายจังหวัด สัปดาห์ที่ 7-8 พ.ศ. 2568 (9-22 กุมภาพันธ์ 2568)

2) ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง สัปดาห์ที่ 7-8 พ.ศ. 2568 (9-22 กุมภาพันธ์ 2568)

โรคที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ (48,279 ราย) รองลงมา คือ โรคอุจจาระร่วง (23,439 ราย) โรคปอดอักเสบ (20,637 ราย) โรคอาหารเป็นพิษ (7,012 ราย) และโรคสுகไส (2,798 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) สูง ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ (6,001 ราย) โรคปอดอักเสบ (5,750 ราย) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (2,190 ราย) โรคไข้เด็งกีทั้งหมด (406 ราย) และโรคอาหารเป็นพิษ (377 ราย)

โรคที่มีอัตราป่วยตายสูง ได้แก่ โรคไทรน (16.67%) โรคเมลิออยโดสิส (1.23%) โรคเลปโตสไปโรสิส (0.93%) และโรคปอดอักเสบ (0.04%)

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนผู้เสียชีวิต และอัตราป่วยตาย ของโรคที่รายงานในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล

(Digital Disease Surveillance: DDS) สัปดาห์ที่ 7-8 พ.ศ. 2568 (9-22 กุมภาพันธ์ 2568)

กลุ่มโรค	โรค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
กลุ่มโรคติดเชื้อจากการสัมผัส	โรคมือเท้าปาก	1,497	128	0	0.00
	โรคเมลิออยโดสิส	81	31	1	1.23
	ไข้เอนเทอโรไวรัส	10	7	0	0.00
	โรคเรื้อน	0	0	0	0.00
กลุ่มโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง	ไข้เด็งกีทั้งหมด	940	406	0	0.00
	โรคสครับไทฟัส	289	61	0	0.00
	ไข้มาลาเรีย	57	18	0	0.00
	ไข้ปวดข้อยุงลาย	9	0	0	0.00
	โรคติดเชื้อไวรัสชิคา	0	0	0	0.00
กลุ่มโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	โรคสுகไสหรือโรคอีสุกอีใส	2,798	49	0	0.00
	ไข้หัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	40	19	0	0.00
	ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน	22	4	0	0.00
	โรคไทรน	6	3	1	16.67
	ไข้หัดเยอรมัน, ไข้หัดเยอรมันที่มีโรคแทรกซ้อน	1	0	0	0.00
	ไข้สมองอักเสบเจแปนนิส	0	0	0	0.00
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	ไข้หวัดใหญ่	48,279	6,001	2	0.00
	โรคปอดอักเสบหรือโรคปอดบวม	20,637	5,750	9	0.04
	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	1,091	113	0	0.00
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง	เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีได้ระบุรายละเอียด	62	19	0	0.00
	ไข้สมองอักเสบ	41	8	0	0.00
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	โรคซิฟิลิส, โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด	1,103	36	0	0.08
	โรคหนองใน	563	1	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีชนิด บี	742	45	0	0.00
	โรคหูดอวยวะเพศและทวารหนัก	311	2	0	0.00
	โรคเริ่มของอวยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก	183	4	0	0.00
	โรคหนองในเทียม	78	0	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีชนิด ซี	126	8	0	0.00
	โรคแผลริมอ่อน	91	0	0	0.00

กลุ่มโรค	โรค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)
	กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	12	0	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด ดี	4	1	0	0.00
กลุ่มโรคระบบทางเดิน อาหารและน้ำ	อาหารเป็นพิษ	7,012	377	0	0.00
	โรคบิดมีตัวหรือโรคบิดจากเชื้ออะมีบา	73	14	0	0.00
	ใช้รากสาดน้อย, ใช้ไทฟอยด์	94	21	0	0.00
	พยาธิใบไม้ในตับ	57	0	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด เอ	36	1	0	0.00
	ใช้รากสาดเทียม, ใช้พาราไทฟอยด์	11	2	0	0.00
	โรคบิดจากเชื้อซิเกลลา	14	0	0	0.00
	โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด	4	0	0	0.00
	โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด อี	4	0	0	0.00
	โรคเลปโตสไปโรซิส	107	41	1	0.93
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส	19	14	0	0.00
	โรคบรูเซลเลซิส	0	0	0	0.00

3) สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

โรคไกรณ

- ในสัปดาห์ที่ 7-8 พ.ศ. 2568 (9-22 กุมภาพันธ์ 2568) โรคไกรณเป็นโรคที่มีอัตราป่วยตายสูงสุด มีรายงานผู้ป่วย 6 ราย (สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน) อัตราป่วย 0.009 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราตาย 0.002 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายน้อยละ 16.67
- พบผู้ป่วยส่วนใหญ่ในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 10-14 ปี (อัตราป่วย 0.077 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี (0.07) และ 5-9 ปี (0.02) ตามลำดับ เป็นผู้ป่วยที่รักษาในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเท่ากัน ร้อยละ 50
- อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนมากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 3 รองลงมา คือ เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 11 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 12 และเขตสุขภาพที่ 1 ตามลำดับ โดย 10 จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด ได้แก่ ชัยนาท (0.32) ตาก (0.18) สระบุรี (0.16) ปัตตานี (0.14) และเชียงใหม่ (0.06)


แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS)

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้เสียชีวิต อัตราตายต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายของโรคไทรน จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 7-8 พ.ศ. 2568 (9-22 กุมภาพันธ์ 2568)


เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	จำนวนผู้เสียชีวิต	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	อัตราป่วยตาย (%)
เขตสุขภาพ 1	1	0.018	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 2	1	0.03	1	0.03	100.000
เขตสุขภาพ 3	1	0.034	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 4	1	0.019	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 5	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 6	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 7	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 8	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 9	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 10	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 11	0	0	0	0	
เขตสุขภาพ 12	1	0.02	0	0	0.000
เขตสุขภาพ 13	1	0.019	0	0	0.000



รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไทรน (ต่อประชากรแสนคน) รายจังหวัด สัปดาห์ที่ 7-8 พ.ศ. 2568 (9-22 กุมภาพันธ์ 2568)



รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไทรน (ต่อประชากรแสนคน) จำแนกตามกลุ่มอายุ สัปดาห์ที่ 7-8 พ.ศ. 2568 (9-22 กุมภาพันธ์ 2568)



รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคไทรน รายสัปดาห์ พ.ศ. 2568 เปรียบเทียบ พ.ศ. 2567 และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี