

สรุปสถานการณ์การเกิดโรคที่สำคัญ สัปดาห์ที่ 10

วันที่ 2 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2546

ในสัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2546 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่น่าสนใจ ดังนี้

1. อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน (Adverse Event Following Immunization)

ได้รับรายงานผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน เป็นเด็กชาย อายุ 4 เดือน (เกิดวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2545) อยู่ที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เวลา 10.00 น. ได้รับวัคซีน DPT เข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ หลังฉีดวัคซีนประมาณ 1 ชั่วโมง เด็กมีอาการไข้ และผื่นขึ้นทั้งตัว แพทย์รับไว้สังเกตอาการ ไม่พบอาการรุนแรงอื่น ๆ เพิ่มขึ้น และผื่นยุบเอง จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ วัคซีนที่ได้รับครั้งนี้ เป็น Lot No. DP 4412 - 4 วันผลิต 08 - 10 - 01 วันหมดอายุ 07 - 04 - 03 จำนวนเด็กที่ได้รับวัคซีน Lot เดียวกันนี้มีทั้งหมด 40 คน ไม่พบผู้ใดมีอาการผิดปกติ จากการซักประวัติมารดา ทราบว่าผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติการชัก ไม่แพ้ยาปฏิชีวนะหรืออาหารใด ๆ แต่เด็กเคยมีประวัติว่า หลังจากได้รับวัคซีน DPT เข็มแรก และ HBV เข็มที่ 2 (เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545) ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง มีอาการไข้ และผื่นขึ้น แต่ไม่ได้พาไปพบแพทย์ ซึ่งมารดาได้บอกประวัติดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังจากฉีดวัคซีน DTP เข็มที่ 2 แล้ว

2. โรคไขสมองอักเสบ (Encephalitis)

ผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 8 ปี อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มป่วยวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ด้วยอาการไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน ไปรักษาที่คลินิกแพทย์ ซึ่งแนะนำให้เข้ารับการรักษที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 แกร็บ มีไข้สูง รู้สึกตัวดี ต่อมาในวันเดียวกัน มีอาการชักเกร็ง 1 ครั้ง อาเจียน ไม่รู้สึกตัว รูม่านตาขยาย 5 มิลลิเมตร แพทย์ใส่เครื่องช่วยหายใจและย้ายผู้ป่วยเข้าห้องดูแลผู้ป่วยหนัก (ICU) และได้ทำ CT scan พบมี diffuse brain edema และ uncal herniation ผลการตรวจเลือด พบ Hct 36 %, wbc 6300, plt count 235000, neutrophil 96 %, lymphocyte 4 % ไม่ได้เจาะน้ำไขสันหลัง ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น เสียชีวิตวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 การวินิจฉัยครั้งสุดท้าย Severe encephalitis with uncal herniation ประวัติครอบครัวบิดามารดามีอาชีพเลี้ยงหมู มีคอกหมูตั้งอยู่ใกล้บ้านพัก เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสอบสวนโรค ค้นหาผู้ป่วยรายอื่นในชุมชน ให้สุกศึกษาและควบคุมโรคโดยพ่นหมอกควันกำจัดยุงในพื้นที่แล้ว ขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นอีก

3. โรคไขเลือดออก (DHF)

ในสัปดาห์ที่ 10 ได้รับรายงานเฝ้าระวังจาก 69 จังหวัด มีรายงานผู้ป่วยโรคไขเลือดออกรวม 409 ราย จังหวัดที่มีรายงานมากที่สุด 5 ลำดับแรก คือ ราชบุรี 33 ราย, อุบลราชธานี 31 ราย, นครปฐม 30 ราย, บุรีรัมย์ 23 ราย และกรุงเทพมหานคร 22 ราย

รวมตั้งแต่ต้นปี 2546 (สัปดาห์ที่ 1 - 10) มีรายงานผู้ป่วยโรคไขเลือดออกสะสม 7,091 ราย เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 11.5 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.06 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 10 ลำดับแรก คือจังหวัด

สมุทรสาคร อัตราป่วย 44.54 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ยะลา 42.11 ต่อประชากรแสนคน, นครปฐม 36.49 ต่อประชากรแสนคน, กระบี่ 30.93 ต่อประชากรแสนคน, ประจวบคีรีขันธ์ 30.04 ต่อประชากรแสนคน, กรุงเทพมหานคร 27.23 ต่อประชากรแสนคน, สงขลา 26.33 ต่อประชากรแสนคน, สุราษฎร์ธานี 25.01 ต่อประชากรแสนคน, ปัตตานี 24.75 ต่อประชากรแสนคน และระยอง 23.87 ต่อประชากรแสนคน

รายงานโดย นางอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล และนางลัดดา ลิขิตยั้งวรา
กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตารางที่ 1 จำนวนป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษา โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ๆ , สัปดาห์ที่ 10 พ.ศ. 2546 (วันที่ 2 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2546)

ตารางที่ 2 จำนวนป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษารายจังหวัด, สัปดาห์ที่ 10 พ.ศ. 2546 (วันที่ 2 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2546)