

4. สถานการณ์ในกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 มีนาคม พ.ศ. 2546 ได้รับรายงานผู้ป่วยรวม 1,862 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต คิดเป็นอัตราป่วย 32.52 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2546 สูงกว่าค่ามัธยฐาน(พ.ศ. 2541 – 2545) และสูงกว่าปี 2545 เขตที่มีอัตราป่วยสะสมสูง คือ ดินแดง ป้อมปราบศัตรูพ่าย ห้วยขวาง ราชบุรีบูรณะ บางซื่อ คลองสาน จตุจักร จอมทอง บางกะปิ ธนบุรี ลาดกระบัง ประเวศ บึงกุ่ม ลาดพร้าว สายไหม

5. อายุและเพศของผู้ป่วย

ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศอย่างชัดเจน สัดส่วนของเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 1.07 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.5) มีอายุมากกว่า 15 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ น้อยกว่า 10 ปี (ร้อยละ 32.8) และกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี (ร้อยละ 28.7) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของปี 2542 ถึง 2545 พบว่าสัดส่วนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี มีสัดส่วนลดลง แต่กลุ่มอายุมากกว่า 15 ปี มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

เรียบเรียงโดย ลัดดา ลิขิตยงวรา อุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

สรุปสถานการณ์การเกิดโรคที่สำคัญ สัปดาห์ที่ 12

วันที่ 16 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2546

ในสัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2546 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่น่าสนใจ ดังนี้

1. โรคพิษสุนัขบ้า

1.1 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรายงานผู้ป่วยชาย อายุ 23 ปี อาชีพรับจ้าง อยู่ที่หมู่ 8 บ้านหัวคำ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง เริ่มป่วยวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2546 ด้วยอาการไข้ต่ำ ๆ ปวดศีรษะ ชี้น้อย อ่อนเพลีย ต่อมาเจ็บคอ แน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน คื่นน้ำแล้วสะอึก กลัวลม เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลร่มเกล้าในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2546 ผู้ป่วยอาการดีขึ้น จึงขอลกลับบ้าน หลังจากกลับบ้านไม่นาน ผู้ป่วยอาเจียนเป็นเลือด ชักเกร็ง แน่นหน้าอก หายใจลำบาก และหมดสติ ญาติจึงนำส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และเสียชีวิตในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2546 ผลการตรวจน้ำลายและเนื้อสมองจากห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบผลบวกต่อพิษสุนัขบ้า ผู้ป่วยมีประวัติถูกสุนัขจรจัดกัดที่บริเวณนิ้วหัวแม่มือซ้าย มีเลือดออกเล็กน้อย ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ได้ทำความสะอาดแผลโดยใช้น้ำเปล่าล้างและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขถูกผู้เสียชีวิตตีตาย และไม่ได้ตัดหัวสุนัขส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมป้องกันได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย จำนวน 3 ราย และประสานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่แล้ว

1.2 จังหวัดชลบุรี ได้รับรายงานผู้ป่วยหญิง อายุ 32 ปี อาชีพรับจ้าง อยู่ที่หมู่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม เริ่มป่วยวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2546 ด้วยอาการรับประทานอาหารและน้ำไม่ได้ กลัวลม ปัสสาวะบ่อย ปวดบริเวณท้องน้อย เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลพนัสนิคม วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2546 ต่อมามีอาการเกร็ง ชัก กลัวลม จึงไปรับการรักษาที่สถานอนามัยหนองเหียง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2546 และส่งไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพนัสนิคม และเสียชีวิตวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2546 ได้เก็บเนื้อสมองส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขณะนี้รอผลการตรวจ ผู้ป่วยให้ประวัติว่าถูกลูกสุนัขอายุ 2 เดือน กัดที่บริเวณนิ้วชี้เท้าข้างขวา เป็นแผลลึก มีเลือดออก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2546 ไม่ทราบประวัติการทำแผล ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขถูกตีตาย และไม่ได้ตัดหัวสุนัขส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัสร่วมบ้านและในชุมชนรวม 29 ราย ผู้สัมผัสในโรงพยาบาลพนัสนิคม 21 ราย และประสานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่แล้ว

รวมตั้งแต่ต้นปี 2546 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 7 ราย จาก 7 จังหวัด ดังนี้ พระนครศรีอยุธยา, ระยอง, ชลบุรี, อุบลราชธานี, ตาก, อุตรดิตถ์ และสงขลา จังหวัดละ 1 ราย

2. โรคหัด

ได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยโรคหัดเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2546 โดยผู้ป่วยเป็นชายม้งและกระเหรี่ยง อยู่ที่ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 ราย (หมู่ 1 (ม้ง) = 16 ราย, หมู่ 11 (ม้ง) = 2 ราย, หมู่ 9 (กระเหรี่ยง) = 2 ราย) เริ่มป่วยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 1 ราย, 20 ก.พ. 1 ราย, 21 ก.พ. 1 ราย, 23 ก.พ. 1 ราย, 1 มี.ค. 2 ราย, 3 มี.ค. 2 ราย, 6 มี.ค. 2 ราย, 7 มี.ค. 1 ราย, 8 มี.ค. 3 ราย, 9 มี.ค. 1 ราย, 13 มี.ค. 2 ราย, 14 มี.ค. 1 ราย, 15 มี.ค. 1 ราย, 17 มี.ค. 1 ราย เป็นนักเรียนของโรงเรียนปางอู๋ 6 ราย อีก 14 ราย เป็นชาวบ้านในหมู่บ้าน อายุ <1 ปี 2 ราย, 1 - 4 ปี 4 ราย, 5 - 9 ปี 9 ราย, 10 - 14 ปี 2 ราย, > 15 ปี 3 ราย ทางสถานีอนามัยปางอู๋ ดำเนินการฉีดวัคซีนหัดให้แก่เด็กอายุ 9 - 12 เดือน และเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และให้สุศึกษาในพื้นที่

รวมตั้งแต่ต้นปี 2546 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคหัด 897 ราย จาก 57 จังหวัด ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 237 ราย รองลงมาได้แก่จังหวัดลำปาง 150 ราย อุทัยธานี และนครสวรรค์ จังหวัดละ 43 ราย ลำพูน 33 ราย

3. โรคไขเลือดออก (DHF)

ในสัปดาห์ที่ 12 ได้รับรายงานเฝ้าระวังจาก 65 จังหวัด มีรายงานผู้ป่วยโรคไขเลือดออกรวม 319 ราย จังหวัดที่มีรายงานมากที่สุด 5 ลำดับแรก คือ อุบลราชธานี 33 ราย, พิจิตร 26 ราย, ศรีสะเกษ 25 ราย, ราชบุรี 20 ราย, บุรีรัมย์ และระยอง จังหวัดละ 19 ราย

รวมตั้งแต่ต้นปี 2546 (สัปดาห์ที่ 1 - 12) มีรายงานผู้ป่วยโรคไขเลือดออกสะสม 8,842 ราย เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 14.91 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.07 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 10 ลำดับแรก คือจังหวัดสมุทรสาคร อัตราป่วย 52.11 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ยะลา อัตราป่วย 46.32 ต่อประชากรแสนคน, นครปฐม อัตราป่วย 40.66 ต่อประชากรแสนคน, ประจวบคีรีขันธ์ อัตราป่วย 38.12 ต่อประชากรแสนคน, ปัตตานี อัตราป่วย 33.64 ต่อประชากรแสนคน, กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 32.52 ต่อประชากรแสนคน, สมุทรปราการ อัตราป่วย 32.32 ต่อประชากรแสนคน, กระบี่ อัตราป่วย 30.66 ต่อประชากรแสนคน, พิจิตร อัตราป่วย 28.24 ต่อประชากรแสนคน และระยอง อัตราป่วย 27.97 ต่อประชากรแสนคน

รายงานโดย กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตารางที่ 1 จำนวนป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษา โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ๆ , สัปดาห์ที่ 12 พ.ศ. 2546 (วันที่ 16 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2546)

ตารางที่ 2 จำนวนป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษารายจังหวัด, สัปดาห์ที่ 12 พ.ศ. 2546 (วันที่ 16 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2546)