


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2546

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

1. สถานการณ์ในภาพรวม


ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่าง ๆ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวม 18,891 ราย เสียชีวิต 15 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 25.50 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.09 ในเดือนมกราคม 2546 พบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน (พ.ศ. 2541 – 2545) และจำนวนผู้ป่วยใกล้เคียงกับปีที่แล้วในช่วงเดือนเดียวกัน เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน พบผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน (พ.ศ. 2541 – 2545) และน้อยกว่าปี 2545 สำหรับเดือนเมษายน ได้รับรายงานผู้ป่วย 3,853 ราย เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งในภาพรวมของประเทศ ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน มีแนวโน้มน้อยกว่าปี 2545 (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรค DF + DHF + DSS จำแนกรายเดือน
ประเทศไทย พ.ศ. 2540 - 2546 และค่ามัธยฐาน (2541 - 2545)




ภาคกลาง มีอัตราป่วยสูงสุด (37.39 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ อัตราป่วย 29.90 ต่อประชากรแสนคน, ตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 18.49 ต่อประชากรแสนคน และเหนือ อัตราป่วย 14.95 ต่อประชากรแสนคน) โดยเขต 4 อัตราป่วยสูงสุด 44.22 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น เขต 3, เขต 1, เขต 4, เขต 11, เขต 8, เขต 7, เขต 2, เขต 9, เขต 5, เขต 6 และเขต 10 ตามลำดับ (รูปที่ 2 – 3)

รูปที่ 2 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน โรค DF+DHF+DSS
จำแนกรายภาค ประเทศไทย พ.ศ. 2546



รูปที่ 3 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน โรค DF+DHF+DSS
จำแนกรายเขต ประเทศไทย พ.ศ. 2546



เมื่อพิจารณาอัตราป่วยสะสมเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมน้อยกว่า 50 ต่อประชากรแสนคน มีจำนวน 69 จังหวัด จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากกว่า 50 ต่อประชากรแสนคน มีจำนวน 7 จังหวัด ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ ระยอง พิจิตร ยะลา

2. สถานการณ์รายเขต

เมื่อพิจารณารายเขตพบว่า เขต 7 มีจำนวนผู้ป่วยในเดือนมกราคมถึงเมษายน 2546 สูงกว่าค่ามัธยฐาน (พ.ศ. 2541 – 2545) ในช่วงเดือนเดียวกัน เขต 4 มีจำนวนผู้ป่วยในเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2546 สูงกว่าค่ามัธยฐาน (พ.ศ. 2541 – 2545) ในช่วงเดือนเดียวกัน ส่วนเดือนเมษายน จำนวนผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน แต่น้อยกว่าเดือนเมษายน ของ ปี 2545

เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า มี 19 จังหวัด ที่พบจำนวนผู้ป่วยในเดือนมกราคมถึงเมษายน 2546 สูงกว่าค่ามัธยฐาน (พ.ศ. 2541–2545) ในช่วงเดือนเดียวกัน ดังนี้

ภาคกลาง เขต 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา

เขต 4 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครปฐม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขต 5 จังหวัด สุรินทร์ ชัยภูมิ มหาสารคาม

เขต 6 จังหวัด อุรธานี สกลนคร

เขต 7 จังหวัด ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครพนม ยโสธร

ภาคเหนือ เขต 9 จังหวัด พิจิตร

ภาคใต้ เขต 11 จังหวัด สุราษฎร์ธานี

เขต 12 จังหวัด นราธิวาส

3. สถานการณ์รายจังหวัด อำเภอ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงในเดือนมีนาคม

1. ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง บางสะพาน ทับสะแก
2. สมุทรปราการ อำเภอเมือง บางพลี พระประแดง
3. พิจิตร อำเภอเมือง ทับคล้อ ตะพานหิน
4. อุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม น้ำยืน ตระการพืชผล ศรีเชียงใหม่
5. ระยอง อำเภอเมือง แกลง
6. สมุทรสาคร อำเภอเมือง กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว
7. สระแก้ว อำเภอเมือง เขาฉกรรจ์ วัฒนานคร อรัญประเทศ
8. นครปฐม อำเภอเมือง สามพราน กำแพงแสน
9. นครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ ตากลิ ไผ่ศาลี
10. เพชรบุรี อำเภอเมือง บ้านลาด
11. ชลบุรี อำเภอเมือง ศรีราชา บางละมุง
12. กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บางซื่อ ราษฎร์บูรณะ ประเวศ ยานนาวา
13. สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน เกาะสมุย เมือง
14. มหาสารคาม อำเภอบรบือ พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม
15. ฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง บ้านโพธิ์
16. นนทบุรี อำเภอเมือง ปากเกร็ด
17. พังงา อำเภอเมือง ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง
18. สมุทรสงคราม อำเภอเมือง อัมพวา
19. นราธิวาส อำเภอสุไหงโกลลก ระแงะ
20. ยโสธร อำเภอเมือง กุดชุม


จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงในเดือนเมษายน

1. ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก เมือง ปราณบุรี
2. ระยอง อำเภอเมือง แกลง
3. อุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม ศรีเชียงใหม่ บุนนาค
4. มุกดาหาร อำเภอดงหลวง เมือง คำชะอี
5. สมุทรปราการ อำเภอเมือง พระประแดง บางพลี
6. นครปฐม อำเภอสามพราน กำแพงแสน เมือง
7. เพชรบุรี อำเภอเมือง ท่ายาง บ้านลาด
8. ศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์ เมือง ขุนหาญ ราชโกล
9. พิจิตร อำเภอเมือง โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล
10. นครสวรรค์ อำเภอตากลิ เมือง พยุหคีรี
11. อุทัยธานี อำเภอเมือง บ้านไร่ ลานสัก
12. กระบี่ อำเภออ่าวลึก เมือง
13. ฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง บางปะกง
14. กำแพงเพชร อำเภอเมือง
15. สุรินทร์ อำเภอเมือง กาบเชิง จอมพระ
16. สระบุรี อำเภอพระพุทธบาท หนองแค
17. จันทบุรี อำเภอโป่งน้ำร้อน เมือง
18. พิษณุโลก อำเภอนครไทย วัดโบสถ์ เนินมะปราง
19. ระนอง อำเภอเมือง
20. กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บางนา ห้วยขวาง สวนหลวง ลาดกระบัง

4. สถานการณ์ในกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ได้รับรายงานผู้ป่วยรวม 2,672 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต คิดเป็นอัตราป่วย 46.66 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 สูงกว่าค่ามัธยฐาน (พ.ศ. 2541 – 2545) และสูงกว่าปี 2545 และเริ่มมีแนวโน้มลดลงในเดือนมีนาคมและเมษายน (รูปที่ 4) เขตที่มีอัตราป่วยสูง คือ ประเวศ ดินแดง บางกะปิ บางซื่อ ราชบุรีรณะ ห้วยขวาง ลาดกระบัง จตุจักร ป้อมปราบศัตรูพ่าย จอมทอง ธนบุรี บางบอน สวนหลวง บึงกุ่ม พระโขนง คลองสาน ลาดพร้าว ดุสิต หลักสี่ บางนา

รูปที่ 4 รายงานโรคไขเลือดออก จำแนกรายเดือน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545, 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ. 2541 - 2545



5. อายุ เพศ และสถานที่รักษาของผู้ป่วย

ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศอย่างชัดเจน อัตราส่วนจำนวนผู้ป่วยของเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 1.08 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 36.2) มีอายุมากกว่า 15 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี (ร้อยละ 30) กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (ร้อยละ 25.3) และกลุ่มอายุ 0- 4 (ร้อยละ 8.4) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของปี 2542 ถึง 2545 พบว่าสัดส่วนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี มีสัดส่วนลดลง แต่กลุ่มอายุมากกว่า 15 ปี มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนสูงสุด (ร้อยละ 34.5) รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป (ร้อยละ 23.5) โรงพยาบาลศูนย์ (ร้อยละ 16.2) คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน (ร้อยละ 15.8) โรงพยาบาลราชการในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 8.1) สถานีอนามัย (ร้อยละ 1) และคลินิกราชการ (ร้อยละ 0.9) ตามลำดับ

รายงานโดย กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

[ตารางที่ 1 จำนวนป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษา โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ๆ , สัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2546 \(วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2546\)](#)

[ตารางที่ 2 จำนวนป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษารายจังหวัด, สัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2546 \(วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2546\)](#)