



# เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control,  
Ministry of Public Health.

## ประจำสัปดาห์

ISSN 0859-547X

<http://epid.moph.go.th/>

ปีที่ ๓๔ : ฉบับที่ ๒๑ : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖, Volume 34 : Number 21 : May 30, 2003

### วิสัยทัศน์

**กรมควบคุมโรค** “ เป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคในประเทศและระดับนานาชาติ ”

**สำนักโรคระบาดวิทยา** “ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสากล ในด้านมาตรฐานงานระบาดวิทยา ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและนานาชาติ สร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญา ป้องกันโรค กัก และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ”

ทุกรายงานมีคุณค่าต่อระบบเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันโรค โปรดช่วยกันตรวจสอบจำนวนและความถูกต้องและส่งให้ทันตามกำหนดเวลา (ภายในเช้าวันอังคาร)

สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	34	44	47	50	59	55	57	62	49	69	63	65

สัปดาห์ที่	13	14	15	16	17	18	19	20	21
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	61	61	59	60	66	65	66	69	67

สัปดาห์ที่ 21 วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 21 ส่งทันเวลา 67 จังหวัด

ปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทย

ส่งข้อมูลทันเวลาสัปดาห์นี้ 67 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 88.16

**รายงานการบาดเจ็บรุนแรงจากถูกทำร้ายในสตรี**  
**รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ระดับชาติ**  
**ประเทศไทย พ.ศ. 2544**

(National Injury Surveillance Report on Assaults in Female,  
Thailand 2001)

สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้จัดตั้งระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้านการบาดเจ็บ วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบบริการผู้บาดเจ็บและระบบส่งต่อในจังหวัด และได้ข้อมูลทางระบาดวิทยาสำหรับวางแผนป้องกันปัญหาการ

- ★ รายงานการบาดเจ็บรุนแรงจากถูกทำร้ายในสตรี รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ระดับชาติ ประเทศไทย พ.ศ. 2544 (National Injury Surveillance Report on Assaults in Female, Thailand 2001) 373
- ★ รายงานการเฝ้าระวังโรคเบาหวานของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1999 379
- ★ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วน สัปดาห์ที่ 21, วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 381

บาดเจ็บในระดับจังหวัดและระดับชาติ ได้เริ่มเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บจาก อุบัติเหตุ ถูกพิษ ถูกทำร้าย และทำร้ายตนเองทุกราย ที่มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในแต่ละภาคของประเทศและในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 และขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ. 2544 สำนักกระบาดวิทยาได้ปรับรูปแบบเป็นระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงระดับชาติ โดยให้โรงพยาบาลเครือข่ายรายงานเฉพาะผู้บาดเจ็บรุนแรง (ผู้บาดเจ็บที่ตายก่อนถึงโรงพยาบาล, ตายที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้บาดเจ็บที่ต้องรับไว้สังเกตอาการ หรือรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน) ซึ่งในปี พ.ศ. 2544 นี้ มีการรายงานข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานมายังสำนักกระบาดวิทยาจำนวน 21 โรงพยาบาล

## ผลการวิเคราะห์

### การบาดเจ็บรุนแรงจากถูกทำร้ายในภาพรวม

ผู้บาดเจ็บรุนแรงจากถูกทำร้าย ในฐานะข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ ปี พ.ศ. 2544 จาก 21 โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ มีจำนวน 8,259 คน (ในจำนวนนี้ตาย 499 คน) ผู้บาดเจ็บจากสาเหตุนี้มีมากเป็นลำดับ 4 มีสัดส่วนร้อยละ 8 ของผู้บาดเจ็บรุนแรงจากทุกสาเหตุที่มารับการรักษา กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้บาดเจ็บรุนแรงจากถูกทำร้ายสูงสุด ร้อยละ 12.5 รองลงมา ภาคใต้ ร้อยละ 9.3 ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้เคียงกันร้อยละ 8 ภาคเหนือต่ำสุด ร้อยละ 7 ของผู้บาดเจ็บทุกสาเหตุที่มารับการรักษา

### การบาดเจ็บรุนแรงจากถูกทำร้ายในสตรี

เฉพาะสตรีที่บาดเจ็บรุนแรงจากถูกทำร้ายในฐานะข้อมูลเดียวกัน มี 1,243 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของผู้บาดเจ็บรุนแรงจากถูกทำร้ายทั้งหมด (ในจำนวนนี้ตาย 61 คน อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 5) ลักษณะทางระบาดวิทยาของสตรีที่บาดเจ็บรุนแรงจากถูกทำร้ายพบได้ทุกกลุ่มอายุ กลุ่มอายุ 20 – 44 ปี พบมากที่สุด ร้อยละ 64 ของผู้บาดเจ็บจากถูกทำร้ายทั้งหมด พบเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี บาดเจ็บจากถูกทำร้ายในรายงานจากเกือบทุกโรงพยาบาลที่เฝ้าระวังฯ รวม 82 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของสตรีที่บาดเจ็บรุนแรงจากถูกทำร้ายทุกกลุ่มอายุ โรงพยาบาลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบสัดส่วนเด็กหญิงถูกทำร้ายรุนแรงสูงสุด ร้อยละ 9 ภาคกลาง ร้อยละ 7 ภาคใต้ ร้อยละ 6 และภาคเหนือ ร้อยละ 5 ไม่พบเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี บาดเจ็บรุนแรงจากถูกทำร้ายในรายงานของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

อาชีพที่พบสูงสุดในรายงานสตรีที่บาดเจ็บรุนแรงจากถูกทำร้ายคือ ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 31 รองลงมาเป็น อาชีพทำสวน ร้อยละ 17 อาชีพค้าขาย, นักเรียน/นักศึกษา และแม่บ้านพบใกล้เคียงกัน ร้อยละ 11 เมื่อพิจารณารายภาคพบเป็นผู้ใช้แรงงานสูงสุดเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ เป็นทำสวน

การทำร้ายสตรีที่บาดเจ็บรุนแรง ส่วนใหญ่ใช้กำลังกาย ร้อยละ 25 รองลงมาเป็นการทำร้ายโดยใช้วัตถุไม่มีคม ร้อยละ 20 การใช้วัตถุมีคม ร้อยละ 14 และใช้อาวุธปืนทุกชนิด ร้อยละ 13.5 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำร้ายโดยใช้กำลังกายมากที่สุด ส่วนภาคใต้ใช้อาวุธปืนมากที่สุด สำหรับกรุงเทพมหานครใช้วัตถุมีคมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเฉพาะการถูกทำร้ายทางเพศโดยใช้กำลังกาย ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 8 ในจำนวนนี้พบสตรีถูกกระทำผิดทางเพศสูงสุด 1 ใน 3 ของการถูกทำร้ายทางเพศ ที่เหลือพบบาดเจ็บเปิดของช่องคลอดและแคมช่องคลอด, การบาดเจ็บของลำไส้ใหญ่, การบาดเจ็บของอวัยวะช่องท้องอื่น และ การบาดเจ็บของหลายอวัยวะในช่องเชิงกราน ฯลฯ

สำหรับวิธีการทำร้ายเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่พบมากที่สุด คือการทำร้ายทางเพศโดยใช้กำลังกาย ร้อยละ 45 รองลงมาเป็นการทำร้ายโดยใช้กำลังกาย ร้อยละ 21 เมื่อพิจารณารายภาค พบการทำร้ายทางเพศโดยใช้กำลังกายสูงสุดในภาคกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ร้อยละ 59, 55 และ 31 สำหรับภาคเหนือพบการทำร้ายโดยใช้กำลังกายสูงสุด ร้อยละ 23 ไม่มีรายงานการถูกทำร้ายในเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี ในโรงพยาบาลเครือข่ายเขตกรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงอายุต่ำกว่า 1 ปี ที่บาดเจ็บรุนแรงจากถูกทำร้าย มีรายงานจาก 2 โรงพยาบาล รวม 2 คน คือ รพศ. หาดใหญ่ อายุ 5 เดือน ถูกทำร้ายโดยการถ่วงน้ำ กัดน้ำทำให้หายใจไม่ออก และเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล รพศ.อุครธานี อายุ 1 เดือน ถูกทำร้ายโดย การถ่วงน้ำ กัดน้ำทำให้หายใจไม่ออก และเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลเช่นกัน

สำหรับการตีมีเครื่องมือที่มีแอลกอฮอล์ในผู้บาดเจ็บ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการถูกทำร้าย พบสัดส่วนการเสพแอลกอฮอล์ในสตรีที่บาดเจ็บรุนแรงจากถูกทำร้ายสูงสุด ในภาคเหนือ ร้อยละ 24 รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 19 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 18 กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ต่ำสุด ร้อยละ 12 และ 10 พบได้ในสตรีตั้งแต่อายุ 10 – 60 ปี โดยร้อยละ 74 อยู่ในกลุ่มอายุ 25 – 49 ปี โดยมีกลุ่มอายุ 40 – 44 ปี สูงสุด

บ้านและบริเวณบ้าน เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุบาดเจ็บจากถูกทำร้ายสูงสุด ร้อยละ 71 รองลงมาเป็นถนนหรือทางหลวง, สถานที่ขายสินค้าและบริการ และพบเช่นนี้ในทุกภาค ช่วงเวลาที่เกิดเหตุบาดเจ็บจากถูกทำร้ายบ่อยที่สุด อยู่ในช่วงค่ำ คือ เวลา 19.00 – 22.00 น.

### การตายจากถูกทำร้าย

จากรายงานของโรงพยาบาลที่เฝ้าระวังฯ ใน ปี พ.ศ. 2544 มีจำนวนตายจากถูกทำร้าย รวม 499 คน แบ่งเป็นตายก่อนถึงโรงพยาบาล 184 คน (37%) ตายในห้องฉุกเฉิน 53 คน (11%) ตายหลังรับไว้รักษา 262 คน (52%) ผู้ตายจากสาเหตุนี้มีมากเป็นลำดับ 2 สัดส่วนร้อยละ 7 ของผู้ตายจากบาดเจ็บทุกสาเหตุในแต่ละโรงพยาบาลที่รายงาน อัตราป่วยตายในสตรีที่บาดเจ็บรุนแรง ร้อยละ 6 จำนวนตายที่รายงานจากแต่ละโรงพยาบาลที่เฝ้าระวังฯ มีตั้งแต่ 12 – 45 คน คิดเป็นร้อยละ 4 – 20

### การตายจากถูกทำร้ายในเพศหญิง

สตรีที่รายงานการตายจากถูกทำร้ายจาก 21 โรงพยาบาล มี 61 คน แบ่งเป็น ตายก่อนถึงโรงพยาบาล 30 คน (49.2%) ตายในห้องฉุกเฉิน 4 คน (6.6%) ตายหลังรับไว้รักษา 27 คน (44.3%) กลุ่มอายุ 25 – 39 ปี สูงสุด คิดเป็น ร้อยละ 51 ของผู้ตายจากถูกทำร้ายทั้งหมด โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ตายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 34 ของผู้ตายทั้งหมด รองลงมาเป็นโรงพยาบาลทางภาคกลาง ร้อยละ 21.3 พบเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี ตายจากถูกทำร้าย 3 คน

วิธีการทำร้ายจนถึงตายที่พบเป็นสัดส่วนสูงสุดในรายงานทุกโรงพยาบาลคือ การยิงด้วยอาวุธปืนต่าง ๆ และการใช้วัตถุระเบิด ร้อยละ 46 รองลงมาเป็นการทำร้ายโดยใช้วัตถุมีคม ร้อยละ 15 สำหรับเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ถูกทำร้ายจนถึงตายมี 3 ราย ในรายงานของ รพศ. หาดใหญ่ อายุ 5 เดือน 1 ราย ถูกทำร้ายโดยการถ่วงน้ำ กัดน้ำทำให้หายใจไม่ออก และเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล รพศ.อุครธานี อายุ 1 เดือน 1 ราย ถูกทำร้ายโดย การถ่วงน้ำ กัดน้ำทำให้หายใจไม่ออก และเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลเช่นกัน สำหรับ รพม.นครราชสีมา อายุ 10 ปี ถูกทำร้ายโดยวัตถุระเบิดและเสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

บ้านและบริเวณบ้าน เป็นลักษณะของสถานที่เกิดเหตุทำร้ายจนถึงแก่ชีวิต เป็นสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 46 ของผู้ตายจากถูกทำร้ายในแต่ละโรงพยาบาล รองลงมาเป็นถนนหรือทางหลวง ร้อยละ 12 เมื่อแยกเป็นรายภาค จะพบว่าบ้านและบริเวณบ้าน เป็นสถานที่ที่ถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตมากที่สุด เช่นเดียวกันเกือบทุกภาค ยกเว้น ภาคใต้เป็นสถานที่ก่อสร้างหรือโรงงานสูงสุด

เวลาที่เกิดเหตุบาดเจ็บถูกทำร้ายจนถึงเสียชีวิตส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง ค่ำ คือ 20.00 – 22.00 น.

### สรุปสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาการถูกทำร้ายในสตรี

จากข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ปี 2543 และ 2544 ของโรงพยาบาลที่เฝ้าระวังฯ และมีข้อมูลเปรียบเทียบกันได้ 2 ปี จำนวน 20 โรงพยาบาล พบว่าการบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายมากเป็นลำดับ 4 เช่นเดียวกัน แนวโน้มปี 2544 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งจำนวนและสัดส่วนผู้บาดเจ็บ พบเฉพาะโรงพยาบาลที่เฝ้าระวังฯในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความรุนแรงของ

ปัญหานี้ในปี 2544 คล้ายกับ ปี 2543 คือ การบาดเจ็บจากสาเหตุนี้พบในทุกภาค ใช้วิธีการที่รุนแรง และพบปัญหาเด็กถูกทำร้าย เช่นเดียวกัน

กลุ่มอายุที่บาดเจ็บจากสาเหตุนี้ทั้งในปี 2543 และ 2544 พบมากในกลุ่มกลุ่มอายุ 25 – 39 ปีเช่นเดียวกัน สำหรับการบาดเจ็บในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในโรงพยาบาลที่เฝ้าระวังฯและมีข้อมูลเปรียบเทียบกันได้ พบว่ารายงานจำนวนสตรีบาดเจ็บรุนแรง ปี พ.ศ. 2544 ลดน้อยลงจากปี พ.ศ. 2543 ประมาณ 30 % (68 คนในปี 2543 ลดลงเป็น 48 คนในปี 2544) ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากคุณภาพความครอบคลุมของข้อมูล ซึ่งมีปัญหาชัดเจนในเกือบทุกโรงพยาบาลในข้อมูล ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเจ้าหน้าที่เวชสถิติมีภาระดูแลระบบข้อมูลนโยบาย 30 บาท มากเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นปีแรก

อาชีพผู้ใช้แรงงานยังคงพบมากที่สุดเช่นเดิมพบแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอาชีพค้าขายในปี 2544

วิธีการทำร้ายโดยวัตถุไม่มีคมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ตายเป็นการทำร้ายด้วยอาวุธปืน จุดเกิดเหตุที่เกิดการบาดเจ็บยังคงเป็นบ้านและบริเวณบ้านเช่นเดิม

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัญหาการถูกทำร้ายในสตรีซึ่งเชื่อกันว่าส่วนใหญ่ไม่รุนแรง อาจต้องพิจารณากันใหม่ เพราะจากรายงานของโรงพยาบาลเครือข่าย 21 แห่ง ยังพบการบาดเจ็บรุนแรงในสตรีถึง 8259 คน เฉลี่ยวันละ 23 คน หรือเกือบ 1 คนต่อชั่วโมง การเฝ้าระวังการบาดเจ็บเพื่อติดตามแนวโน้ม และปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ดังที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอย่างต่อเนื่องนี้ไม่เพียงพอในการแก้ปัญหา ผู้บริหารและนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านสังคม พฤติกรรม จิตวิทยา อาชีววิทยา รวมทั้งการแพทย์และสาธารณสุข ควรเร่งสนับสนุนและร่วมมือศึกษาปัญหานี้ เพื่อทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยยับยั้งไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยทุเลาปัญหา ทั้งในด้านผู้ทำร้าย ผู้ถูกทำร้าย มูลเหตุ และสถานการณ์ซึ่งเกิดเหตุเพื่อนำผลมาใช้วางแผนป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และควรมุ่งสนับสนุนการศึกษาวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ก่อน เนื่องจากมีปัญหามากกว่าภาคอื่น

วิเคราะห์และรายงานโดย : วันสสนันท์ รุจิวิวัฒน์ และแพทย์หญิงไมพันธุ์ สันติกาญจน์

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เมษายน 2546

ตารางที่ 1 การบาดเจ็บรุนแรงเฉพาะการถูกทำร้ายในเพศหญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ ของโรงพยาบาลที่มีการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ระดับชาติ พ.ศ 2544

กลุ่มอายุ	นครราชสีมา		นครศรีธรรมราช		ราชบุรี		ลำปาง		นครสวรรค์		ยะลา		จันทบุรี		เชียงราย		หาดใหญ่		ขอนแก่น	
	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %
0ถึง<1ปี	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.3	0.0	0.0
1ถึง <5ปี	0.0	0.0	1.0	1.5	1.0	1.2	1.0	2.3	0.0	0.0	1.0	6.7	0.0	0.0	2.0	2.6	2.0	2.6	0.0	0.0
5ถึง <10ปี	0.0	0.0	1.0	1.5	2.0	2.4	0.0	0.0	1.0	1.3	1.0	6.7	0.0	0.0	1.0	1.3	3.0	3.8	1.0	1.6
10ถึง <15ปี	1.0	1.1	2.0	2.9	13.0	15.9	3.0	7.0	2.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
15ถึง <20ปี	7.0	7.4	7.0	10.3	11.0	13.4	1.0	2.3	2.0	2.5	1.0	6.7	1.0	2.0	5.0	6.5	8.0	10.3	6.0	9.7
20ถึง <25ปี	9.0	9.5	5.0	7.4	13.0	15.9	6.0	14.0	10.0	12.7	2.0	13.3	8.0	16.0	5.0	6.5	5.0	6.4	10.0	16.1
25ถึง <30ปี	11.0	11.6	11.0	16.2	10.0	12.2	5.0	11.6	12.0	15.2	5.0	33.3	6.0	12.0	12.0	15.6	14.0	17.9	10.0	16.1
30ถึง <35ปี	11.0	11.6	8.0	11.8	10.0	12.2	6.0	14.0	8.0	10.1	1.0	6.7	8.0	16.0	8.0	10.4	6.0	7.7	5.0	8.1
35ถึง <40ปี	10.0	10.5	8.0	11.8	7.0	8.5	10.0	23.3	15.0	19.0	1.0	6.7	7.0	14.0	15.0	19.5	12.0	15.4	7.0	11.3
40ถึง <45ปี	13.0	13.7	9.0	13.2	7.0	8.5	6.0	14.0	8.0	10.1	0.0	0.0	5.0	10.0	11.0	14.3	9.0	11.5	11.0	17.7
45ถึง<50ปี	12.0	12.6	8.0	11.8	2.0	2.4	3.0	7.0	7.0	8.9	1.0	6.7	7.0	14.0	3.0	3.9	4.0	5.1	6.0	9.7
50ถึง<55ปี	9.0	9.5	4.0	5.9	3.0	3.7	2.0	4.7	5.0	6.3	1.0	6.7	6.0	12.0	7.0	9.1	9.0	11.5	3.0	4.8
55ถึง <60ปี	3.0	3.2	2.0	2.9	1.0	1.2	0.0	0.0	4.0	5.1	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.2
60 ปีขึ้นไป	9.0	9.5	2.0	2.9	1.0	1.2	0.0	0.0	5.0	6.3	1.0	6.7	1.0	2.0	5.0	6.5	5.0	6.4	1.0	1.6
ไม่ทราบอายุ	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
รวม	95.0	100.0	68.0	100.0	82.0	100.0	43.0	100.0	79.0	100.0	15.0	100.0	50.0	100.0	77.0	100.0	78.0	100.0	62.0	100.0

แหล่งข้อมูล : 21 โรงพยาบาลในเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงระดับชาติ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตารางที่ 1 (ต่อ) การบาดเจ็บรุนแรงเฉพาะการถูกทำร้ายในเพศหญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ ของโรงพยาบาลที่มีการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ระดับชาติ พ.ศ 2544

กลุ่มอายุ	อุดรธานี		เลย		นพรัตน์		ระยอง		ชลบุรี		พิษณุโลก		สุราษฎร์ธานี		ตรัง		อุบลราชธานี		นครปฐม		พระนครศรีอยุธยา		รวม	
	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %	เจ็บ	col %
0ถึง<1ปี	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.2
1ถึง <5ปี	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.7	1.0	1.8	0.0	0.0	2.0	3.6	17.0	1.4
5ถึง <10ปี	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	1.0	2.3	1.0	1.8	1.0	1.6	0.0	0.0	15.0	1.2
10ถึง <15ปี	20.0	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.5	2.0	3.3	0.0	0.0	48.0	3.9	
15ถึง <20ปี	27.0	19.1	2.0	18.2	2.0	11.8	1.0	3.6	2.0	3.6	4.0	7.4	4.0	5.6	4.0	9.3	6.0	10.5	10.0	16.4	7.0	12.7	118.0	9.5
20ถึง <25ปี	15.0	10.6	4.0	36.4	1.0	5.9	2.0	7.1	8.0	14.5	7.0	13.0	7.0	9.7	0.0	0.0	6.0	10.5	6.0	9.8	11.0	20.0	140.0	11.3
25ถึง <30ปี	22.0	15.6	2.0	18.2	5.0	29.4	5.0	17.9	8.0	14.5	6.0	11.1	13.0	18.1	9.0	20.9	12.0	21.1	14.0	23.0	13.0	23.6	205.0	16.5
30ถึง <35ปี	10.0	7.1	0.0	0.0	3.0	17.6	5.0	17.9	7.0	12.7	8.0	14.8	14.0	19.4	7.0	16.3	12.0	21.1	10.0	16.4	4.0	7.3	151.0	12.1
35ถึง <40ปี	10.0	7.1	2.0	18.2	1.0	5.9	7.0	25.0	10.0	18.2	6.0	11.1	10.0	13.9	6.0	14.0	4.0	7.0	6.0	9.8	2.0	3.6	156.0	12.6
40ถึง <45ปี	13.0	9.2	0.0	0.0	1.0	5.9	2.0	7.1	5.0	9.1	10.0	18.5	9.0	12.5	8.0	18.6	3.0	5.3	8.0	13.1	5.0	9.1	143.0	11.5
45ถึง<50ปี	8.0	5.7	0.0	0.0	1.0	5.9	0.0	0.0	7.0	12.7	6.0	11.1	9.0	12.5	2.0	4.7	4.0	7.0	2.0	3.3	8.0	14.5	100.0	8.0
50ถึง<55ปี	4.0	2.8	1.0	9.1	1.0	5.9	2.0	7.1	2.0	3.6	3.0	5.6	3.0	4.2	0.0	0.0	3.0	5.3	1.0	1.6	0.0	0.0	69.0	5.6
55ถึง <60ปี	5.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.6	2.0	3.6	1.0	1.9	1.0	1.4	1.0	2.3	0.0	0.0	1.0	1.6	1.0	1.8	26.0	2.1
60 ปีขึ้นไป	2.0	1.4	0.0	0.0	2.0	11.8	1.0	3.6	3.0	5.5	3.0	5.6	1.0	1.4	3.0	7.0	3.0	5.3	0.0	0.0	2.0	3.6	50.0	4.0
ไม่ทราบอายุ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.2
รวม	141.0	100.0	11.0	100.0	17.0	100.0	28.0	100.0	55.0	100.0	54.0	100.0	72.0	100.0	43.0	100.0	57.0	100.0	61.0	100.0	55.0	100.0	1243.0	100.0

แหล่งข้อมูล : 21 โรงพยาบาลในเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงระดับชาติ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตารางที่ 2 การตายเฉพาะการถูกทำร้ายในเพศหญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ ของโรงพยาบาลที่มีการเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรง ระดับชาติ พ.ศ. 2544

กลุ่มอายุ	นครราชสีมา		นครศรีธรรมราช		ราชบุรี		ลำปาง		นครสวรรค์		ยะลา		จันทบุรี		เชียงใหม่		หาดใหญ่		ขอนแก่น	
	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %
0ถึง<1ปี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0
1ถึง<5ปี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0
5ถึง<10ปี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0
10ถึง<15ปี	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0
15ถึง<20ปี	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0
20ถึง<25ปี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0
25ถึง<30ปี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	33.3	0	0
30ถึง<35ปี	1	14.3	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0
35ถึง<40ปี	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	33.3	0	0.0	2	100.0	2	33.3	0	0	0	0
40ถึง<45ปี	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0
45ถึง<50ปี	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	33.3	1	100
50ถึง<55ปี	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0	0	0
55ถึง<60ปี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0
60 ปีขึ้นไป	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0
ไม่ทราบอายุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0
รวม	7	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0.0	2	100.0	6	100.0	3	100	1	100

แหล่งข้อมูล : 21 โรงพยาบาลในเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงระดับชาติ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตารางที่ 2 (ต่อ) การตายเฉพาะการถูกทำร้ายในเพศหญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ ของโรงพยาบาลที่มีการเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรง ระดับชาติ พ.ศ. 2544

กลุ่มอายุ	อุดรธานี		เลย		นพรัตน์		ระยอง		ชลบุรี		พิษณุโลก		สุราษฎร์ธานี		ตรัง		อุบลราชธานี		นครปฐม		พระนครศรีอยุธยา		รวม	
	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %	ตาย	col %
0ถึง<1ปี	1.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.3
1ถึง<5ปี	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5ถึง<10ปี	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10ถึง<15ปี	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6
15ถึง<20ปี	1.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.6
20ถึง<25ปี	2.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	50.0	1.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.2
25ถึง<30ปี	3.0	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	25.0	1.0	50.0	2.0	66.7	2.0	66.7	12.0	19.7	
30ถึง<35ปี	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	50.0	2.0	33.3	1.0	100.0	2.0	50.0	0.0	0.0	1.0	33.3	0.0	0.0	9.0	14.8	
35ถึง<40ปี	1.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	33.3	10.0	16.4	
40ถึง<45ปี	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.3	
45ถึง<50ปี	2.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	11.5	
50ถึง<55ปี	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.2	
55ถึง<60ปี	1.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	
60 ปีขึ้นไป	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.3	
ไม่ทราบอายุ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	
รวม	11.0	100.0	0.0	0.0	0.0	2.0	100.0	2.0	100.0	6.0	100.0	1.0	100.0	4.0	100.0	2.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	61.0	100.0	

แหล่งข้อมูล : 21 โรงพยาบาลในเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงระดับชาติ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค