



เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

สำนักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control,
Ministry of Public Health.

ประจำสัปดาห์

ISSN 0859-547X

<http://epid.moph.go.th/>

ปีที่ ๓๔ : ฉบับที่ ๓๐ : ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖, Volume 34 : Number 30 : August 1, 2003

วิสัยทัศน์

กรมควบคุมโรค “ เป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคในประเทศและระดับนานาชาติ ”

สำนักงานระบาดวิทยา “ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสากล ในด้านมาตรฐานงานระบาดวิทยา ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและนานาชาติ สร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญา ป้องกันโรคภัย และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ”

ทุกรายงานมีคุณค่าต่อระบบเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันโรค โปรดช่วยกันตรวจสอบจำนวนและความถูกต้องและส่งให้ทันตามกำหนดเวลา (ภายในเช้าวันอังคาร)

สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	34	44	47	50	59	55	57	62	49	69	63	65	61	61	59

สัปดาห์ที่	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	60	66	65	66	69	67	63	66	69	70	64	66	64	65	61

สัปดาห์ที่ 30 วันที่ 20 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 30 ส่งทันเวลา 61 จังหวัด

ปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทย

ส่งข้อมูลทันเวลาสัปดาห์นี้ 61 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 80.26

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2546

ข้อมูลถึง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

1. สถานการณ์ในภาพรวม

ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สำนักงานระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวม 35,679 ราย เสียชีวิต 38 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 56.81 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.11 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานในเดือนมกราคม สูงกว่าค่ามัธยฐาน (พ.ศ.2541 – 2545) ของช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยในเดือน

* สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2546

ข้อมูลถึง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 543

* การสอบสวนภาวะเป็นพิษ

จากการดื่มไวน์ ที่จังหวัดชลบุรี 548

* สารไนโตรมรณะ

549


* ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วน สัปดาห์ที่ 30,

วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 551

กุ่มภาพันธุ์ลดลงเล็กน้อย แล้วเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน แต่ยังไม่ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน (พ.ศ. 2541 – 2545) ของช่วงเวลาเดียวกัน (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรค DF+DHF+DSS จำแนกรายเดือน ประเทศไทย


พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545



พบผู้ป่วยกระจายทุกภาค โดยภาคกลาง มีอัตราป่วยสูงสุด 64.26 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ อัตราป่วย 58.61 ต่อประชากรแสนคน, ภาคใต้ อัตราป่วย 52.20 ต่อประชากรแสนคน และภาคเหนือ อัตราป่วย 44.17 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน โรค DF + DHF + DSS


ประเทศไทย และจำแนกรายภาค พ.ศ. 2546



แต่เมื่อพิจารณารายเขต พบว่า เขต 7 ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด 99.82 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา เป็น เขต 3 เขต 4 เขต 1 ตามลำดับ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน โรค DF + DHF + DSS


จำแนกรายเขต ประเทศไทย พ.ศ. 2546



เมื่อพิจารณาอัตราป่วยสะสมเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากกว่า 50 ต่อประชากรแสนคน มีจำนวน 35 จังหวัด (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 อัตราป่วย/ประชากรแสนคน โรค DF + DHF + DSS จำแนกรายจังหวัด

ข้อมูลสะสม 1 มกราคม - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2546



2. สถานการณ์รายจังหวัด (ข้อมูล 1 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2546)

ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้รับรายงานผู้ป่วย รวม 12,485 ราย เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งข้อมูลยังมีความล่าช้าในบางจังหวัด (รูปที่ 5)



เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า

จังหวัดระยองซึ่งมีอัตราป่วยสูงสุดในช่วงนี้ จำนวนผู้ป่วยสูงที่อำเภอแกลง 168 ราย รองลงมาเป็น อำเภอเมือง 155 ราย และอำเภอบ้านฉาง 47 ราย

จังหวัดอุบลราชธานี มีรายงานผู้ป่วยสูงที่อำเภอเมือง 192 ราย, อำเภอตระการพืชผล 176 ราย, อำเภวารินชำราบ 121 ราย, อำเภอเดชอุดม 101 ราย และอำเภอพิบูลมังสาหาร 79 ราย

จังหวัดศรีสะเกษ มีรายงานผู้ป่วยสูงที่อำเภอกันทรลักษณ์ 181 ราย, อำเภอเมือง 99 ราย, อำเภอขุนช้าง 56 ราย, อำเภอกันทรารมย์ 42 ราย และอำเภอรามัน 42 ราย

จังหวัดนครพนม มีรายงานผู้ป่วยสูงที่ อำเภอเมือง 182 ราย และ อำเภอธาตุพนม 74 ราย


จังหวัดอำนาจเจริญ มีรายงานผู้ป่วยสูงที่อำเภอเมือง 74 ราย และอำเภอลืออำนาจ 32 ราย

3. สถานการณ์ในกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้รับรายงานผู้ป่วย รวม 3,644 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต คิดเป็นอัตราป่วย 63.02 ต่อประชากรแสนคน โดยพบว่าจำนวนผู้ป่วยสูงในช่วงต้นปี และลดต่ำลงเรื่อย ๆ จนถึงเดือนมิถุนายน โดยพบว่าจำนวนผู้ป่วยในเดือนมิถุนายนน้อยกว่าค่ามัธยฐานในช่วงเดือนเดียวกัน (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2545, 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545



เขตที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 คือ เขตบางกะปิ 37 ราย, เขตมีนบุรี 30 ราย, เขตบางกอกน้อย 30 ราย, เขตสวนหลวง 27 ราย, เขตลาดพร้าว 27 ราย, เขตจตุจักร 26 ราย, เขตราชบุรีรณะ 25 ราย, เขตลาดกระบัง 24 ราย, เขตหนองจอก 23 ราย และเขตดินแดง 23 ราย

4. อายุของผู้ป่วย

เมื่อศึกษาข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 พบว่า สัดส่วนกลุ่มอายุของผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 15 ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.17 ในปี พ.ศ. 2539 เป็น ร้อยละ 30.33 ในปี พ.ศ. 2545 สำหรับปี พ.ศ. 2546 (ข้อมูล ถึง 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2546) พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 65.8 มีอายุ <15 ปี และร้อยละ 34.2 มีอายุ ≥ 15 ปี (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 สัดส่วนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ

ประเทศไทย พ.ศ. 2539 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

