

ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 : 1 มีนาคม 2545 <http://epid.moph.go.th/>

วิทยาลัยกองระบาดวิทยา

“เป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญ พัฒนามาตรฐาน ประสานเครือข่ายระบาดวิทยา  
ของประเทศและสากล มุ่งผลดีนำแนวทางเสริมสร้างสุขภาพ”

## สารบัญ

✦ ก้าวทันโรค	125
ภาพโรคระบาดในประเทศอินเดีย	
✦ ข้อมูลรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาเร่งด่วน	127
สัปดาห์ที่ 8 (17-23 กุมภาพันธ์ 2545)	
✦ แผนภูมิโรคไข้เลือดออก	133
✦ สรุปข่าวการระบาด	135
(วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2545)	
✦ บันทึกท้ายบท	136
✦ ข่าวประชาสัมพันธ์	137
.....	
ทุกรายงานมีคุณค่าต่อระบบเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันโรค	
โปรดช่วยกันตรวจสอบ จำนวนและความถูกต้อง และส่งให้ทันตามกำหนดเวลา	
.....	
โปรดส่งรายงานให้กองระบาดวิทยาภายในเช้าวันอังคาร	

สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2545

ส่งรายงานข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์นี้ 52 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 68.42

## ก้าวทันโรค

ภาพโรคระบาดในประเทศอินเดีย

โดย กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ  
กองระบาดวิทยา

รายงานจาก Communicable Disease Surveillance and Response (CSR) ขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศอินเดียได้รายงานการระบาดของกาฬโรคปอด (Pneumonic plague) จำนวน 16 ราย เสียชีวิต 4 ราย ในหมู่บ้าน Hat Koti Village ซึ่งเป็นหมู่บ้านเชิงเขาหิมาลัย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอำเภอ Shimla Distric รัฐ Himachal Pradesh State พบผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ และรายสุดท้าย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545

จากสำนักข่าว CNN.com/WORLD ได้รายงานเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงเรื่องการระบาดของกาฬโรคจากรัฐ Himachal Pradesh State ว่าหญิงวัย 30 ปี เสียชีวิตด้วยสงสัยว่าเป็นกาฬโรค ทีมงานจาก New Delhi based National Institute of Communicable Diseases (NICD) ได้ทำการสอบสวนโรค และสามารถควบคุมโรคได้แล้ว เนื่องจากไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มหลังจาก 48 ชั่วโมง ได้มีการจ่ายยาปฏิชีวนะ จำนวน 675,000 แคปซูล สำหรับประชาชน 17,000 คน แล้ว และมีการปิดโรงเรียนด้วย

ในการระบาดครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขของประเทศอินเดียรายงานว่า เป็นกาฬโรคปอด (Pneumonic plague) ซึ่งการระบาดของกาฬโรคปอดง่ายมาก การติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อโรค (*Yersinia pestis*) ที่อยู่ในละอองซึ่งจามหรือไอ

จากผู้ป่วย กาฬโรคปอดนี้มักจะระบาดรุนแรง รวดเร็วและง่ายกว่ากาฬโรคต่อมน้ำเหลือง (Bubonic plague) และกาฬโรคในกระแสโลหิต (Septicemic plague)

ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 18 ตุลาคม 2537 ได้เกิดการระบาดของกาฬโรคอย่างรุนแรงที่รัฐมหาราษ รัฐกุลจารัตน์ รัฐกานาทกา รัฐอัสสัม ประเทศ รัฐมัลยาประเทศ และนิวเดลี มีผู้ป่วยและผู้ต้องสงสัย จำนวน 693 ราย เสียชีวิต 56 ราย ปกติกาฬโรคเป็นโรคประจำถิ่นของประเทศอินเดีย มักจะมีข่าวการระบาดเนื่อง ๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับกาฬโรค สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำเดือน ของกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 9 กันยายน 2544 หน้า 289-292