

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มคนงาน พ.ศ. 2544

กมลชนก เทพลีธา

กลุ่มงานระบบประสาทวิทยาโรคเอดส์

กองระบบประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

กองระบบประสาทวิทยาดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มคนงานชายหญิง ใน 20 จังหวัด เป้าหมาย เมื่อเดือนมิถุนายน 2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวโน้มของการมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี พฤติกรรมที่สำคัญ คือ การมีเพศสัมพันธ์ และการไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ที่มิใช่คู่นอนของตนเอง (non – regular sex partners) โดยให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง ไม่ระบุชื่อและที่อยู่ ผลการเฝ้าระวังในคนงานชาย 4,797 คน และหญิง 5,619 คน พบคนงานชายตอบว่าแต่งงานแล้ว ร้อยละ 41.8 และคนงานหญิงที่แต่งงานแล้ว ร้อยละ 52.4 สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีที่น่าสนใจ มีดังนี้

1.ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก : คนงานชาย เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 77.7 เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เมื่ออายุเฉลี่ย 17.9 ปี พบการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก เพื่อนสนิท ร้อยละ 47.3 ส่วนกลุ่มคนงานหญิง เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 64.5 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 19.5 ปี และมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก เพื่อนสนิท ร้อยละ 11.4

2.การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก : คนงานชายใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคิดเป็นร้อยละ 30.7 ในขณะที่คนงานหญิงใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเพียงร้อยละ 11.9

3.ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ในปีที่แล้วและการใช้ถุงยางอนามัย : คนงานทั้งชายและหญิงให้ประวัติว่าในปีที่แล้วมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก เพื่อนสนิทมากที่สุด โดยในกลุ่มคนงานชาย พบการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก เพื่อนสนิท ร้อยละ 43.5 และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 28.7 มีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการ ร้อยละ 17.6 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 58.4 มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นร้อยละ 27.9 และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 32.4 สำหรับการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายพบร้อยละ 4.1 และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 29.2 ในกลุ่มคนงานหญิง มีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก เพื่อนสนิท ร้อยละ 21.1และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 8.8 มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอื่น (ไม่ใช่แฟน /คูรัก) ร้อยละ 6.1 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 20.4 ส่วนการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน เช่น เงิน สิ่งของ พบร้อยละ 2.4

พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มคนงาน ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรกระตุ้นจิตสำนึกให้คนงานเห็นความสำคัญของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และเน้นการมีเพศสัมพันธ์เฉพาะกับผู้ที่เป็นคู่นอนของตนเอง (regular sex partners) เท่านั้น