

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2545 จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2545 กองระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DF+DHF+DSS) เรื้อรัง จำนวน 53,342 ราย ตาย 75 ราย (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1,564 ราย) อัตราป่วยเท่ากับ 85.61 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.14 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงส่วนใหญ่อยู่ในเขต 11 เขต 12 และ เขต 3 จังหวัดที่มีอัตราป่วย เกิน 50 ต่อประชากรแสนคน จำนวน 56 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 73.68

สัดส่วนผู้ป่วย DF ร้อยละ 27.56, DHF ร้อยละ 69.82 และ DSS ร้อยละ 2.62 กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วย 75.83 ต่อประชากรแสนคน เขต 1, 2, 3 และ 4 อัตราป่วย 69.18, 36.30, 123.50 และ 66.37 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

เขต 5, 6, 7 มีอัตราป่วย 74.56, 96.03 และ 53.15 ตามลำดับ

เขต 8, 9, 10 มีอัตราป่วย 73.03, 98.43 และ 18.33 ตามลำดับ

เขต 11 มีอัตราป่วย 201.90 และเขต 12 เท่ากับ 152.94 ต่อประชากรแสนคน

ในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกกระบาดมากกว่าฤดูอื่นๆ เมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้น ต้องรีบออกไปควบคุมโรค โดยการกำจัดยุงลายทันที ตามด้วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย ถ้าพบผู้ป่วยเพิ่มหลังจากไปกำจัดยุงลายแล้ว 7 วัน แสดงว่าการควบคุมยุงลายไม่ได้ผล จำเป็นต้องออกไปกำจัดตัวแก่ต่อไป และควรสำรวจลูกน้ำยุงลายด้วย เพื่อประเมินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในท้องถิ่น