

ปีที่ 5 ฉบับที่ 29 : 24 กรกฎาคม 2545 <http://epid.moph.go.th/>

วิสัยทัศน์กองระบาดวิทยา

“เป็นศูนย์กลางเชี่ยวชาญระดับสากล ในด้านมาตรฐานงานระบาดวิทยา ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและนานาชาติ สร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญา ป้องกันโรค ภัย และส่งเสริมสุขภาพประชาชน”

สารบัญ

★ ก้าวทันโรค	455
- ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ พ.ศ. 2544	455
- สถานการณ์โรคไขเลือดออก	456
- เตรียมพร้อมและซักซ้อมการเฝ้าระวังสอบสวน และควบคุมป้องกันโรค เลปโตสไปโรซิส	457
★ ข้อมูลรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาเรื้อรัง สัปดาห์ที่ 29 (14 – 20 กรกฎาคม 2545)	460
★ แผนภูมิโรคไขเลือดออก	466
★ สรุปข่าวการระบาด (วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2545)	468
★ บันทึกท้ายบท	473
ทุกรายงานมีคุณค่าต่อระบบเฝ้าระวัง และการควบคุมป้องกันโรค โปรดช่วยกันตรวจสอบ จำนวนและความถูกต้อง และส่งให้ทันตามกำหนดเวลา โปรดส่งรายงานให้กองระบาดวิทยา ภายในเช้าวันอังคาร	

สัปดาห์ที่ 29 ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2545

ส่งรายงานข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาเรื้อรัง

ทันตามกำหนดเวลา สัปดาห์นี้ จำนวน 56 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 73.68

ก้าวทันโรค

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ พ.ศ. 2544

กมลชนก เทพสิทธิ

กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคเอดส์

กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

กองระบาดวิทยา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ใน 20 จังหวัด เป้าหมาย เมื่อเดือนมิถุนายน 2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวโน้มของการมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี พฤติกรรมที่สำคัญ คือ การมีเพศสัมพันธ์ และการไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ที่มีคู่นอนของตนเอง (non – regular sex partners) โดยให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง ไม่ระบุชื่อและที่อยู่ ผลการเฝ้าระวังในหญิงตั้งครรภ์จำนวน 5,797 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.0 มีอายุ

ระหว่าง 20 – 29 ปี พบหญิงตั้งครรภ์ตอบว่าแต่งงานแล้ว ร้อยละ 79.9 และอยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้แต่งงาน ร้อยละ 15.1 สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีที่น่าสนใจ มีดังนี้

1.ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก : เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อายุต่ำสุด 9 ปี อายุสูงสุด 29 ปี อายุเฉลี่ย 19.2 ปี พบการมีเพศสัมพันธ์กับสามี ร้อยละ 89.1 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟน คนรัก เพื่อนสนิท ร้อยละ 9.3 และมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่สามีตนเอง ร้อยละ 1.6

2.การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก : หญิงตั้งครรภ์ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคิดเป็นร้อยละ 13.0

3.ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ในปีที่แล้วและการใช้ถุงยางอนามัย : หญิงตั้งครรภ์ให้ประวัติว่าในปีที่แล้วเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่สามีตนเอง ร้อยละ 3.8 และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 26.5 ส่วนการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน เช่น เงิน สิ่งของ พบร้อยละ 2.3

พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ถึงแม้ว่าจะพบสัดส่วนความเสี่ยงไม่มากนัก แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างจิตสำนึกของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในกลุ่มประชากรนี้ ซึ่งเป็นวัยเจริญพันธุ์ โดยเน้นการมีเพศสัมพันธ์เฉพาะกับผู้ที่เป็คู่่นอนของตนเอง (regular sex partners) เท่านั้น

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

นายองอาจ เจริญสุข
ที่ปรึกษากองระบาดวิทยา

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2545 กองระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DF + DHF + DSS) จำนวน 57,417 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 92.15 ต่อประชากรแสนคน ตาย 85 ราย อัตราป่วยตายเป็นร้อยละ 0.15 จำนวนผู้ป่วยเพิ่มจากสัปดาห์ก่อน 4,075 ราย เพิ่มขึ้น 10 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงส่วนใหญ่อยู่ในเขต 11 เขต 12 และเขต 3 จังหวัดที่มีอัตราป่วยเกิน 100 ต่อประชากรแสนคน จำนวน 26 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 34.21 จังหวัดที่มีอัตราป่วยระหว่าง 50-100 ต่อประชากรแสนคน จำนวน 32 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 42.10 และอัตราป่วยระหว่าง 0-50 ต่อประชากรแสนคน จำนวน 18 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 23.69

สัดส่วนผู้ป่วย DF ร้อยละ 27.82 DHF ร้อยละ 69.59 และ DSS ร้อยละ 2.59 อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยแต่ละอาการจะมีสัดส่วนเล็กน้อยเพียงใด การป้องกันและควบคุมโรคยังคงต้องดำเนินการเหมือนกัน

กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 78.64 เขต 1, 2, 3 และ 4 มีอัตราป่วยเท่ากับ 73.23, 37.90, 130.09 และ 71.33 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

เขต 5, 6 และ 7 มีอัตราป่วยเท่ากับ 81.18, 106.05 และ 57.04 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

เขต 8, 9 และ 10 มีอัตราป่วย 81.95, 102.91 และ 21.124 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

เขต 11 และ 12 มีอัตราป่วย 210.72 และ 165.10 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ