


ระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2545 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 6 ราย เป็นชาวไทย 4 ราย ต่างชาติ 2 ราย พบเชื้อ *Vibrio cholerae* El tor inaba ทั้งหมด จากอำเภอเนินกุ่มพัฒนา 1 ราย (เริ่มป่วยล่าสุดวันที่ 23 ตุลาคม 2545) และ อำเภอเมือง 5 ราย (เริ่มป่วยล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2545)

มีผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปี รวม 76 ราย กระจายใน 5 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง 67 ราย (เริ่มป่วยระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 21 ตุลาคม 2545) เนินกุ่มพัฒนา 4 ราย (เริ่มป่วยล่าสุดวันที่ 23 ตุลาคม 2545) บ้านค่าย 3 ราย (เริ่มป่วยล่าสุดวันที่ 24 กันยายน 2545) บ้านฉาง 1 ราย (เริ่มป่วยล่าสุดวันที่ 15 กันยายน 2545) และ ปลวกแดง 1 ราย (เริ่มป่วยล่าสุดวันที่ 21 สิงหาคม 2545)

จังหวัดกระบี่ (เขต 11)

ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2545 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 3 ราย จากอำเภอเมือง (ผู้ป่วยรายสุดท้ายเริ่มป่วยล่าสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2545) พบเชื้อ *Vibrio cholerae* El tor inaba ทั้งหมด มีผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปี รวม 10 ราย จากอำเภอเมืองทั้งหมด



สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส

นสพ. ประวิทย์ ชุมเกษียร

ที่

ปรึกษาสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2545 จนถึงสัปดาห์ที่ 45 (3 - 9 พฤศจิกายน) มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซิส 5,450 ราย ตาย 90 ราย คิดเป็นอัตราป่วยและอัตราตาย 88.06 และ 0.14 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายร้อยละ 1.65 เป็นผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 83.32 (4,541 ราย)

ภาคเหนือร้อยละ 18.75 (1,022 ราย) ภาคกลาง ร้อยละ 2.78 (152 ราย) และภาคใต้ร้อยละ 2.53 (138 ราย) เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ทั้งจำนวนผู้ป่วยและจำนวนผู้เสียชีวิต สูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย (ปี 2544 ป่วย 5,218 ราย ตาย 71 ราย) คาดว่าปีนี้มีจำนวนผู้ป่วย/ตายด้วยโรคเลปโตสไปโรซิสสูงกว่าปีที่แล้ว

จังหวัดที่มีอัตราป่วยตายสูงได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ป่วย 1 ราย และเสียชีวิต นครนายก ป่วย 2 ราย ตาย 1 ราย กาญจนบุรี ป่วย 2 ราย ตาย 1 ราย นครพนม และสุราษฎร์ธานี ป่วยจังหวัดละ 5 ราย และตาย จังหวัดละ 1 รายเท่ากัน สระบุรี ป่วย 12 ราย ตาย 2 ราย ชลบุรี ป่วย 13 ราย ตาย 2 ราย และนราธิวาส ป่วย 14 ราย ตาย 2 ราย ทุกจังหวัดที่กล่าวมานี้ถือว่า มีอัตราป่วยตายค่อนข้างสูง (ถ้าจะมีนักวิชาการท่านใดสนใจวิเคราะห์หาสาเหตุและนำมาเสนอในรายงานนี้บ้าง ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก)

แม้ว่าช่วงนี้จะเข้าสู่ปลายปีแล้ว แต่ปรากฏว่า ยังมีฝนตกชุกอยู่แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบกับปีนี้มือน้ำท่วมอย่างกว้างขวาง เกษตรกรในหลาย ๆ จังหวัด ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส โดยเฉพาะในตอนที่ยังไปย่ำน้ำเกี่ยวข้าว วิดปลา ปักเบ็ด สำหรับภาคใต้ ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน อาจเกิดการระบาดของโรคนี้เมื่อใดก็ได้ ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมป้องกันโรคนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปอีกระยะหนึ่ง

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2545 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก (DF+DHF+DSS) รวม 100,361 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 161.07 ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าสัปดาห์ก่อน 1,519 ราย (เป็นผู้ป่วยสัปดาห์นี้ 382 ราย และผู้ป่วยย้อนหลัง 1,137 ราย แสดงว่า ในเดือนตุลาคมและ พฤศจิกายนยังมีผู้ป่วยสูงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขต 12) ตาย 158 ราย เท่ากับสัปดาห์ก่อน อัตราป่วยตายคงที่ ร้อยละ 0.16

สัดส่วนผู้ป่วยไข้เด็งกี (DF) ร้อยละ 28.65 ไข้เลือดออก (DHF) ร้อยละ 68.69 และไข้เลือดออกช็อก (DSS) ร้อยละ 2.64

จังหวัดที่มีอัตราป่วยเกิน 500 ต่อประชากรแสนคน 1 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 1.31 ได้แก่ จังหวัดยะลา

จังหวัดที่มีอัตราป่วย 400 - 499 ต่อประชากรแสนคน 4 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 5.26 ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พัทลุง กระบี่ และ นครศรีธรรมราช

จังหวัดที่มีอัตราป่วย 300 - 399 ต่อประชากรแสนคน 3 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 3.94 ได้แก่ จังหวัดพังงา นราธิวาส และ ปราจีนบุรี

จังหวัดที่มีอัตราป่วย 200 - 299 ต่อประชากรแสนคน 11 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 14.47 ได้แก่ จังหวัดสตูล สงขลา ระยอง ตรัง จันทบุรี ขอนแก่น เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ปัตตานี และ บุรีรัมย์

จังหวัดที่มีอัตราป่วย 100 - 199 ต่อประชากรแสนคน 34 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 44.73

จังหวัดที่มีอัตราป่วย 50 - 99 ต่อประชากรแสนคน 16 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 21.05

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่ำกว่า 50 ต่อประชากรแสนคน 7 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 9.21