



รายงาน

WESR

**เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ประจำสัปดาห์**

Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักงานโรค ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859-547X

ปีที่ ๓๕ : ฉบับที่ ๗ : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

Volume 35 : Number 7 :

สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	54	53	49	58	60	58	68																			

สัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 7 ส่งทันเวลา 68 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 89.47

ปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

**สรุปสถานการณ์การเกิดโรคที่สำคัญ สัปดาห์ที่ 7
ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
Summarize of the Priority Diseases
Occurrence,**

ในสัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สำนักงานโรค ควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคในข่ายงานเฝ้าระวังที่น่าสนใจ ดังนี้

1. โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ราย ที่จังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยเป็นชายอายุ 48 ปี อาชีพรับจ้างปูพื้นบ้าน อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เริ่มป่วยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ด้วยอาการชา เจ็บ เสียว และคันอย่างรุนแรงบริเวณ นิ้วชี้ข้างขวาที่ถูกสุนัขกัด ร่วมกับมีอาการกลืนน้ำและกลืนลม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพัทลุงในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เสียชีวิตในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่าผู้ป่วยถูกสุนัขของเจ้าของบ้านที่ไปรับจ้างปูพื้นบ้านกัดในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ขณะให้อาหารแก่สุนัขดังกล่าว หลังจากนั้นได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและล้างแผลที่สถานอนามัย โดยไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขตัวนี้ มีอาการซึมและเบื่ออาหารในช่วง 2 วันก่อนกัดผู้ป่วย หลังจากถูกสุนัขจรจัดตัวหนึ่งกัดที่ปากได้ 2 - 3 วัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ได้สอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ผู้สัมผัสทั้งหมด 10 ราย ส่วนสุนัขจรจัดและสุนัขตัวนี้ได้หายไปจากชุมชน

ผู้ป่วยรายนี้นับเป็นรายที่ 2 ของปี พ.ศ. 2547 โดยรายแรกเป็นชาย อายุ 19 ปี อาชีพรับจ้าง อยู่ในอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ถูกสุนัขกัดที่ขาขวา ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยไม่ได้ล้างแผลและไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มป่วยวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 และเสียชีวิตในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2547



สารบัญ

- ◆ สรุปสถานการณ์การเกิดโรคที่สำคัญ สัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 105
- ◆ ความคืบหน้ากรณี iVDPV รายแรกในประเทศไทย 106
- ◆ ระบาดวิทยากับการประกันคุณภาพการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค 109
- ◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วน สัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 113

2. โรคเลปโตสไปโรซิส จำนวน 1 ราย ที่จังหวัดยะลา ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ 40 ปี อาชีพแม่บ้าน อยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 ด้วยอาการมีไข้เจ็บพลงัน ทนาลัน ปวดกล้ามเนื้อ และกดเจ็บบริเวณน่องอย่างรุนแรง ปวดศีรษะ คอแข็ง ตาแดง ไอแห้ง ๆ และมีปัสสาวะสีเข้ม ไปรักษาที่โรงพยาบาลยะลา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ตรวจพบ IgM Positive แพทย์วินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรค Leptospirosis ขณะนี้ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลยะลา

จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น คาดว่าผู้ป่วยน่าจะติดเชื้อจากการสัมผัสน้ำที่มีเชื้อ เนื่องจากอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในเขตเมือง มีน้ำท่วมขังและหนูชุกชุม นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงวัวและแพะบริเวณที่อยู่อาศัย ผู้ป่วยมักจะใส่รองเท้าแตะลุยน้ำและเดินบนดินที่ชื้นแฉะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้สอบสวนและควบคุมโรคแล้ว ไม่พบผู้ป่วยรายอื่นในชุมชน

จากการเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส สะสมทั้งสิ้น 106 ราย กระจายในพื้นที่ 27 จังหวัด เป็นผู้ป่วยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 72 ราย ภาคใต้ 14 ราย ภาคกลาง และภาคเหนือแห่งละ 10 ราย โดยจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สุรินทร์ (15 ราย) บุรีรัมย์ (12 ราย) ร้อยเอ็ด (9 ราย) ศรีสะเกษ (7 ราย) สระบุรี (6 ราย) กาฬสินธุ์ (6 ราย) ขอนแก่น (6 ราย) และ นครศรีธรรมราช (6 ราย)

3. โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง จำนวน 87 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เป็นผู้ป่วยชาย 56 ราย ผู้ป่วยหญิง 31 ราย อายุตั้งแต่ 2 เดือน - 82 ปี ทำ Rectal Swab พบเชื้อ *Vibrio Cholerae* EI Tor Inaba 85 ราย อีก 2 รายไม่ระบุ Serotype โดยมีวันเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ผู้ป่วยกระจายอยู่ในพื้นที่ 15 จังหวัดดังนี้ กรุงเทพมหานคร 37 ราย (กระจายในพื้นที่ 27 เขต) เพชรบูรณ์ 11 ราย ปทุมธานี 7 ราย สงขลา 6 ราย ระยอง 5 ราย ขอนแก่น 4 ราย นนทบุรี 3 ราย ตรัง 3 ราย เชียงใหม่ 3 ราย ฉะเชิงเทรา 3 ราย และอีก 5 รายจากจันทบุรี สุรินทร์ ลพบุรี ชลบุรี กระบี่ อีกแห่งละ 1 ราย

จากการเฝ้าระวังโรคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงทั้งสิ้น 317 ราย เสียชีวิต 2 ราย (รายแรกเป็นคณงานก่อสร้าง อายุ 45 ปี อยู่ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เริ่มป่วยวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 เสียชีวิตในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2547 ส่วนรายที่ 2 เป็นคณงานก่อสร้างชาวพม่า พักอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เริ่มป่วยวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2547 เสียชีวิต วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2547) สำหรับจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (127 ราย) นนทบุรี (52 ราย) ปทุมธานี (17 ราย) Mukdahan (15 ราย) และเพชรบูรณ์ (11 ราย)

รายงานโดย สุชาดา จันทสิริยากร และอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา