



สรุปสถานการณ์โรคที่มีลำดับความสำคัญสูง สัปดาห์ที่ 15
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 4 – เสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2547
Summarize of the Priority Diseases Occurrence,
15th Week April 4 Sunday – April 10 Saturday, 2004

จากรายงานผู้ป่วยโรคที่มีลำดับความสำคัญที่ได้รับรายงานในสัปดาห์ที่ 15 (ตารางที่ 1) พบว่า โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าสัปดาห์เดียวกันของปี พ.ศ.2546 ยังคงเป็นโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง และโรคมือ เท้า และปาก และโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังคือ อุจจาระร่วงอย่างแรง (รูปที่ 1) สำหรับโรคปอดบวมที่ต้องเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลและโรคมือ เท้าและปากไม่มีค่ามัธยฐานเนื่องจากการเก็บข้อมูลไม่ถึง 5 ปี



สำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงสะสม ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 1,092 ราย ตาย 6 ราย พบใน 47 จังหวัด สัปดาห์นี้มีรายงาน จำนวน 35 ราย ตาย 2 ราย (รูปที่ 2) เริ่มพบผู้ป่วยหลายจังหวัดทางภาคใต้ 22 ราย (สุราษฎร์ธานี 11 ราย กระบี่ 7 ราย นครศรีธรรมราช 2 ราย ตาย 1 ราย ชุมพรและพังงาจังหวัดละ 1 ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 ราย ตาย 1 ราย (นครราชสีมา 8 ราย ตาย 1 ราย สกลนคร อุดรธานี และสุรินทร์จังหวัดละ 1 ราย) ภาคกลาง 2 ราย (กรุงเทพมหานคร และสระบุรี จังหวัดละ 1 ราย) ภาคเหนือไม่พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง (ตารางที่ 2) จังหวัดที่ควรให้ความสนใจพิเศษเนื่องจากยังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง ประปรายตั้งแต่มีนาคมจนถึงก่อนวันเทศกาลสงกรานต์คือ ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี ตรัง และสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครราชสีมา ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่สำนักกระบาดวิทยาได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 14.5 วันหลังผู้ป่วยเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยรายงานใน 24 ชั่วโมง คือ จังหวัดน่านและกระบี่

สำหรับโรคปอดบวมที่ต้องเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล สัปดาห์นี้มีรายงาน 305 ราย โรคมือ เท้าและปากตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน มีรายงาน 405 ราย ตาย 1 ราย (จังหวัดอุทัยธานี) สัปดาห์นี้มีรายงานจำนวน 4 ราย จากจังหวัด เพชรบูรณ์ 2 ราย ลำปาง และขอนแก่นจังหวัดละ 1 ราย โรคมือ เท้าและปาก มักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝน (พฤษภาคม- มิถุนายน) จังหวัดที่พบผู้ป่วยรายแรกควรรับทำการสอบสวนโรคโดยเฉพาะถ้าพบผู้ป่วยในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กหรือในพื้นที่ที่อยู่กันอย่างแออัด เพราะสถานที่เหล่านี้จะมีการแพร่ของเชื้อได้มาก ควรรับดำเนินการสอบสวนโรคเพื่อป้องกันการระบาดของโรค

รายงานโดย สุวรรณ

เทพสุนทร