

รายงานการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เดือนพฤษภาคม 2547
Adverse Events Following Immunization Surveillance Report, May 2004

ลำดับ	เพศ	อายุ	จังหวัด	อาการ	การวินิจฉัย	วัคซีน/เลขที่ผลิต	ผลการรักษา
1	ญ	11 ค	กทม.	ผื่นแดงขึ้นตามหน้าและ ลำตัว	อาการแพ้ (Allergic reaction)	MMR/5704	หาย
2	ช	6 ค	แพร่	ไข้ เกร็ง กระตุก	อาการชักที่มีไข้ร่วมด้วย (Febrile seizure)	DTP/ไม่ทราบ OPV/ไม่ทราบ HBV/ไม่ทราบ	หาย
3	ช	1ป8ค	ศรีสะเกษ	ไข้ 38C เกร็ง กัดฟัน ไม่ชัก	อาการชักที่มีไข้ร่วมด้วย (Febrile seizure)	DTP4/DP4514-4 OPV4/W6033 JE1/JJ4603-3 หรือ JE1/JJ4602-2	หาย
4	ญ	5 ค	ฉะเชิงเทรา	ไข้ ท้องอืด ซึม ชักเกร็ง ตา้าง	Asphyxia	DTP/DP4604-1 OPV/W6032	เสียชีวิต
5	ญ	10 ค	กทม.	ผื่นลมพิษขึ้นทั้งตัว	อาการแพ้ (Allergic reaction)	MMR/5704	หาย
6	ช	2 ค	สมุทรสงคราม	วันที่ 2 หลังฉีด มีไข้ไอ ชัก เกร็ง ตา้าง หลังจากนั้นอีก 5 วัน มีไข้ ชักเกร็ง ค้นขาซ้าย ตำแหน่งที่ฉีดมีก้อน เส้น ผ่าศก. 1 นิ้ว	อาการชักที่มีไข้ร่วมด้วย (Febrile seizure)	DTP2/DP4605-1	หาย
7	ช	5 ค	กทม.	เป็นไตบริเวณที่ฉีด	ฝีไร้เชื้อบริเวณที่ฉีด (Sterile abscess)	Pedvax Hib/D3522	หาย
8	ญ	66 ป	กทม.	ไข้สูง 41.9 C ปัสสาวะขจัด มีน้ีรยะ ปวดกล้ามเนื้อ/กระดูก อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร	ไข้ (Fever)	Fluad vaccine/4005	หาย
9	ญ	1ป9ค	นครราชสีมา	วันที่ 15 หลังฉีด มีผื่นคัน ไข้ วันที่ 17 หลังฉีด บวม ตึง ตามหน้าลำตัว แขน ขา และผื่นคัน	อาการแพ้ (Allergic reaction)	DTP4/DP4422-1 OPV4// ไม่ทราบ JE1/JJ4616-3, JE2/4616-3	หาย
10	ช	1ป6ค	กทม.	มีผื่นแดง บริเวณใบหน้า หลัง ลำตัว แขน ขา มีปื้นแดงบริเวณหัวไหล่ ที่ฉีดวัคซีน ไขหู 2 ข้าง ขา และเท้าทั้ง 2 ข้าง	อาการแพ้ (Allergic reaction)	DTP4/DP4605-3	หาย

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร และสำนักระบาดวิทยา

หมายเหตุ: รายงานนี้ไม่ได้ระบุสาเหตุของการเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

รายงานโดย กนกทิพย์ ทิพย์รัตน์

กลุ่มพัฒนาระบบและมาตรฐานงานระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา