


ตั้งแต่ต้นปีสำนักงานระบาดวิทยาได้รับรายงานการเกิดการระบาดของอาหารเป็นพิษอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ได้รับรายงานผู้ป่วย 286 ราย ที่จังหวัดนครปฐม จากเชื้อ *Bacillus cereus* ปนเปื้อนในอาหารที่รับประทาน จากการปรุงอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และเก็บไว้นาน ก่อนที่จะนำมารับประทาน
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการรับประทานแมงดาทะเล ที่ชลบุรี 1 ราย
- วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ได้รับรายงานผู้ป่วย 241 ราย ที่จังหวัดขอนแก่น จากเชื้อ *Staphylococcus aureus* พบเชื้อในกะทิสด เนื่องจากผู้คั้นกะทิมีแผลที่มือ
- วันที่ 22 - 23 เมษายน พ.ศ. 2547 ได้รับรายงานผู้ป่วย 54 ราย ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จากเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* ปนเปื้อนในอาหารที่รับประทาน
- เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษ ที่ จังหวัดเลย 3 ราย กระบี่ 4 ราย อุตรดิตถ์ 1 ราย พิชณุโลก 2 ราย และเชียงใหม่ 1 ราย
- วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้รับรายงานผู้ป่วย 34 ราย ที่จังหวัดสมุทรปราการ จากสาร Methomyl ปนเปื้อนในเครื่องดื่ม
- วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ได้รับรายงานผู้ป่วย 349 ราย ที่จังหวัดปทุมธานี จากเชื้อ *Staphylococcus aureus* ปนเปื้อนในอาหาร
- วันที่ 10 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ได้รับรายงานผู้ป่วย รวม 858 ราย ที่จังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร กาฬสินธุ์ จากเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* ปนเปื้อนในกุ้งที่รับประทาน

และอีกหลายการระบาดที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้อย่างชัดเจน สำหรับข้อมูลจากบัตรรายงาน 506 พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม – ต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 มีรายงานผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจำนวน 89,536 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 142.3 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 11 ราย โดยพบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (224.2) รองลงมาภาคเหนือ (166) ภาคกลาง (81.4) และภาคใต้ (47.9) ตามลำดับ


เรียบเรียงโดย ลัดดา ลิขิตยัษฐา
กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักงานระบาดวิทยา



สถานการณ์โรคปอดอักเสบ ประเทศไทย พ.ศ. 2547 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2547)
Pneumonia Surveillance Report in Thailand, 2004 (as of July 31, 2004)

สำนักงานระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานมัณฑนเทศมณฑล ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จำนวน 66,514 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 105.91 ต่อประชากรแสนคน ในช่วง 3 เดือนแรกของปีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่ามัธยฐาน (พ.ศ. 2542 – 2546) และจำนวนผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2546 เดือนเมษายนถึงมิถุนายนจำนวนผู้ป่วยต่ำกว่ามัธยฐาน แต่สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2546 (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ จำแนกรายเดือน ประเทศไทย พ.ศ. 2547
เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2546 และ ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2542 – 2546)




ภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด 140.20 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ภาคใต้ 115.41 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 105.23 ต่อประชากรแสนคน และภาคกลาง 82.55 ต่อประชากรแสนคน

เขตที่มีอัตราป่วยสูงแตกต่างจากเขตอื่นมากมี 4 เขตได้แก่ เขต 18 (178.68 ต่อประชากรแสนคน) เขต 1 (177.53 ต่อประชากรแสนคน) เขต 15 (153.03 ต่อประชากรแสนคน) และเขต 13 (145.06 ต่อประชากรแสนคน) เขตที่มีอัตราป่วยมากกว่าอัตราป่วยของประเทศมี 7 เขต ได้แก่ เขต 1, 3, 4, 6, 13, 15 และ 18 (รูปที่ 2)

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยของประเทศมี 35 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่


1. แม่ฮ่องสอน เขต 1 (348.31)
2. ยะลา เขต 18 (262.37)
3. เชียงราย เขต 1 (224.30)
4. นราธิวาส เขต 18 (220.87)
5. ลำปาง เขต 1 (215.54)
6. สุรินทร์ เขต 13 (210.74)
7. อุทัยธานี เขต 3 (207.23)
8. ฉะเชิงเทรา เขต 8 (201.46)
9. พะเยา เขต 1 (184.84)
10. ลำพูน เขต 1 (175.83)

รูปที่ 2 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคปอดอักเสบ จำแนกรายเขต
ประเทศไทย พ.ศ. 2547 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547)




จำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน มีถึงร้อยละ 54.86 (36,441 ราย) ของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบทั้งหมด โดยเขตที่มีสัดส่วนผู้ป่วยในมากที่สุด 3 เขตได้แก่ เขต 17 (ร้อยละ 88.01) เขต 4 (ร้อยละ 81.53) และเขต 7 (ร้อยละ 81.44) ส่วนเขตที่มีสัดส่วนผู้ป่วยในน้อยที่สุดได้แก่ เขต 14 (ร้อยละ 20.90) (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 สัดส่วนผู้ป่วยในโรคปอดอักเสบจำแนกรายเขต
ประเทศไทย พ.ศ.2547 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547)



กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี (761.78 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป (301.09 ต่อประชากรแสนคน) และกลุ่มอายุ 55-64 ปี (99.14 ต่อประชากรแสนคน) (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 อัตราป่วยโรคปอดอักเสบจำแนกตามกลุ่มอายุ
ประเทศไทย พ.ศ.2547 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547)



กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไปมีอัตราตายสูงสุด (7.28 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 55-64 ปี (1.36 ต่อประชากรแสนคน) และกลุ่มอายุ 0-4 ปี (0.91 ต่อประชากรแสนคน) (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 อัตราตายโรคปอดอักเสบจำแนกตามกลุ่มอายุ
ประเทศไทย พ.ศ.2547 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547)

