

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 42 ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2547
(Outbreak Verification Summary, 42nd Week, October 10 - 16, 2004)

ในสัปดาห์ที่ 42 ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2547 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานโรคในข่ายงานเฝ้าระวังที่น่าสนใจ ดังนี้

1. บาดทะยักในทารกแรกเกิด 1 ราย ที่จังหวัดราชบุรี ขณะนี้อาการทรุดหนัก

ผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 11 วัน อยู่บ้านเลขที่ 28/2 หมู่ 5 ตำบลคอนทราย อำเภอบัวชุม เริ่มป่วยวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ด้วยอาการไม่ดูดนมและน้ำ และร้องไห้ไม่หยุด ขาเข้าใจว่า เด็กปวดท้อง ใช้ปูนแดงผสมใบกระเพราทารอบ ๆ ท้อง อาการไม่ทุเลา จึงได้นำเด็กเข้ารับการรักษารักษาโรงพยาบาลเจ้าเจ็ดสิบ และถูกส่งเข้ารับการรักษาคือโรงพยาบาลโพธารามในวันเดียวกัน แรกได้รับ วัดอุณหภูมิได้ 36.8 องศาเซลเซียส ชีพจร 156 ครั้ง/นาที หายใจ 56 ครั้ง/นาที ตาและตัวเหลือง ปลายมือปลายเท้าคล้ำเล็กน้อย ริมฝีปากเขียวคล้ำ และเกร็งกระตุกตลอดเวลา ตรวจ CSF gram stain ให้ผล No Growth ผลตรวจ Electrolyte ปกติ และไม่มีภาวะ Hypocalcemia ขณะนี้ผู้ป่วยอาการทรุดหนักและใส่ท่อช่วยหายใจ

จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยคลอดวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ที่โรงพยาบาลเจ้าเจ็ดสิบ โดยมีพยาบาลวิชาชีพใช้กรรไกรตัดสายสะดือ น้ำหนักแรกคลอด 3300 กรัม มารดาไม่ได้ฝากครรภ์ และไม่ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักขณะตั้งครรภ์ ผู้ป่วยเป็นบุตรคนสุดท้องจากพี่น้องทั้งหมด 7 คน ทุกคนคลอดที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดรายแรกในรอบ 10 ปี ของจังหวัดราชบุรี

จากการเฝ้าระวังตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดทั้งสิ้น 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย จากจังหวัดต่าง ๆ แห้งละ 1 ราย ดังนี้ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย ปราจีนบุรี (เสียชีวิต) ราชบุรี สกลนคร และปัตตานี สำหรับปี พ.ศ. 2546 มีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 6 ราย จากจังหวัดเชียงราย 3 ราย จังหวัดสระบุรี สกลนคร และปัตตานี อีกแห่งละ 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

2. ใช้เลือดออกและเสียชีวิต 1 ราย ที่จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 7 ปี 5 เดือน อยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ 9 บ้านโนนมีชัย ตำบลละลวย อำเภอกันทรลักษ์ เริ่มป่วยวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547 ด้วยอาการไข้ ไอ และมีน้ำมูกเล็กน้อย ไปรับยาที่สถานีอนามัยบ้านละลวย 2 ครั้ง ทำ Tourniquet test ให้ผลลบ อาการไม่ดีขึ้น ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547 ผู้ป่วยปวดท้อง ท้องอืด มือเท้าเย็นญาติจึงพาเข้ารับการรักษาคือโรงพยาบาลกันทรลักษ์ แรกได้รับอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส วัดความดันโลหิตและชีพจรไม่ได้ ดับโตกดแล้วเจ็บ มีอาการเลือดออกตามผิวหนัง และมีเลือดออกบริเวณมุมปากและลิ้นเล็กน้อย แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น DHF with DSS grade 4 และถูกส่งเข้ารับการรักษาคือโรงพยาบาลศรีสะเกษในวันเดียวกัน ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น ไม่รู้สึกตัว กระสับกระส่าย หายใจหอบมาก และเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้น

จากการสอบสวนโรค พบว่า ผู้ป่วยมีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัว และไม่พบผู้ป่วยรายอื่นในชุมชนใกล้เคียง และในโรงเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้ทำการควบคุมโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ให้สุขศึกษาและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน และโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

จากการเฝ้าระวังตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกจากสำนักงานสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 30,188 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 47.86 ต่อประชากรแสนคน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 39 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.13 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ชุมพร(122.19), ระยอง (108.85), นครปฐม(102.41), ลำพูน(91.68), จันทบุรี(90.70) ตามลำดับ สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ มีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 796 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 54.31 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย

3. อาหารเป็นพิษที่จังหวัดนนทบุรี พบผู้ป่วย 5 ราย ขณะนี้ทุกคนอาการปกติ

ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เวลา 15.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนนทเวชว่ามีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 5 ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 3 ราย อายุ 28 - 75 ปี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

จากการสอบสวนโรค พบว่า ผู้ป่วยทั้ง 5 ราย เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 4 ราย อยู่บ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำนนทบุรี เลขที่ 117/6 หมู่ 4 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี อีก 1 ราย เป็นเพื่อนบ้าน ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เวลา 11.00 - 11.30 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยทุกคนได้รับประทานข้าว น้ำพริกกะปิ ปลาพุดทอด ถั่วพุดต้ม ถั่วพุดสด ถั่วฝักยาวสด แตงกวา และปลาร้าทอด หลังจากนั้นประมาณ 10 - 15 นาที ผู้ป่วยรายแรกเพศชาย อายุ 50 ปี เริ่มมีอาการเวียนศีรษะ ปวดท้องพะอืดพะอม คลื่นไส้และอาเจียน ต่อจากนั้นไม่นานผู้ป่วยรายที่สองซึ่งเป็นภรรยา อายุ 42 ปี และผู้ป่วยรายที่สามและสี่ ซึ่งเป็นแม่ภรรยา อายุ 75 ปี และหลานชายของผู้ป่วยรายแรก อายุ 28 ปี เริ่มมีอาการเวียนศีรษะ ใจสั่น ปวดและมวนท้อง คลื่นไส้ และอาเจียน ส่วนผู้ป่วยรายสุดท้ายเพศหญิง อายุ 38 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ได้รับร่วมรับประทานอาหารดังกล่าว เวลา 11.30 น. เริ่มป่วยเวลา 12.45 น. ด้วยอาการพะอืดพะอม ใจสั่น เหงื่อออก คลื่นไส้และอาเจียน แพทย์รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ขณะนี้ทุกคนหายเป็นปกติแล้ว

จากการสอบสวนโรค พบว่า อาหารที่รับประทานทั้งหมดได้เตรียมและปรุง ในตอนเช้าวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยผู้ป่วยรายที่สอง โดยนำกะปิที่ญาติซื้อมาจากชุมพร โขลกรวมกับเครื่องปรุงและกุ้งแห้งที่ได้แช่น้ำ ประมาณ 10 นาที ปลาทุไ้จากเพื่อนบ้าน ตอนเช้า และทอดรับประทานร้อน ๆ ผักสดซื้อจากวัดสังฆทานในตอนเช้า นำมาล้างน้ำธรรมดา ส่วนปลาริวกิวซื้อจากจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แช่ไว้ในตู้เย็นก่อนนำมาทอด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้สอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่แล้ว พร้อมได้เก็บตัวอย่างอาหาร ได้แก่ น้ำพริกกะปิ ปลาทุทอด ผักสด ปลาริวกิว น้ำดื่ม และเลือดผู้ป่วยทุกราย ส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรค และสารเคมีที่อาจปนเปื้อนในอาหารดังกล่าว ขณะนี้กำลังรอผล

เรียบเรียงโดย สุชาดา จันทสิทธิ์กร และอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล

กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา




**รายงานการบาดเจ็บรุนแรง และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของผู้ขับขี่ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งในช่วง “วันออกพรรษา”
รายงานการเฝ้าระวังระดับชาติ พ.ศ. 2546**

ความเป็นมา

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ติดตามแนวโน้มการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง จากรายงานการเฝ้าระวังระดับชาติ ปี พ.ศ. 2541 – 2546 (จาก 14 โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด และกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศ) พบ จำนวนผู้บาดเจ็บรุนแรง (รับไว้สังเกตอาการ/รับไว้รักษาในโรงพยาบาล หรือ ตาย) จากอุบัติเหตุขนส่ง สูงขึ้นค่อนข้างคงที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2544 และสูงเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2545 – 2546 (รูปที่ 1) เดือน เมษายน, ธันวาคม และ มกราคม เป็นเดือนที่มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งสูงที่สุด แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2546 พบว่า เดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในช่วงปี พ.ศ. 2541 – 2544 และผู้บาดเจ็บเดือนพฤศจิกายนยังสูงเป็นปีที่ 2 รองจากเดือนธันวาคม ใน ปี พ.ศ. 2546 (รูปที่ 2)

รูปที่ 1 จำนวนผู้บาดเจ็บรุนแรงจากทุกสาเหตุ และ อุบัติเหตุขนส่ง จำแนกรายปี ปี พ.ศ. 2541 – 2546



แหล่งข้อมูล: 14 โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข