

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง สตูล และตรัง ตลอดจนอาสาสมัครทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุน การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคเชิงรุกอย่างดียิ่ง จนนำไปสู่ความสำเร็จในการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอ ขอบขอบคุณองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand MOPH – U.S. CDC Collaboration) ที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการและส่งผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข มาช่วยในเหตุ การณ์นี้ ด้วยความมีน้ำใจดี

ขอแสดงความชื่นชม ต่อการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ของบุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน จากกรมควบคุมโรค ที่ร่วมมือกันทำงานในทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค และทีมควบคุมโรค ที่ได้ดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค อย่างเข้มแข็ง จนสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดใหญ่ของโรค ได้เป็นผลสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย



สถานการณ์โรค/ภัย สำคัญ

สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอาการในประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547


สมาน สมบุญจินันท์ ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคได้รับรายงาน ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการ จากสถานบริการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 รวมทั้งสิ้น 351,183 ราย และมีผู้เสียชีวิต 84,706 ราย โดยจำแนกเป็น ผู้ป่วยเอดส์จำนวน 260,996 ราย และมีผู้เสียชีวิต 73,633 ราย (ตามปีที่เริ่มป่วย) ผู้ติดเชื้อที่มีอาการจำนวน 90,187 ราย และมีผู้เสียชีวิต 11,073 ราย (ตามปีที่เริ่มป่วย) เมื่อพิจารณา เฉพาะผู้ป่วยเอดส์ พบว่า

ผู้ป่วยเอดส์ เพศชายพบ 187,113 ราย เพศหญิง พบ 73,883 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1 : 2.54 กลุ่มอายุ ที่พบมาก เป็นกลุ่มวัยทำงาน ที่มีอายุระหว่าง 20 - 39 ปี พบว่า กลุ่มอายุ 30 – 34 ปี มีผู้ป่วยสูงสุด (ร้อยละ 25.76 รองลงมา อายุ 25 - 29 ปี (ร้อยละ 25.54) , อายุ 35 - 39 ปี (ร้อยละ 16.43), อายุ 20 - 24 ปี (ร้อยละ 9.33) และต่ำสุดในกลุ่ม อายุ 10-14 ปี (ร้อยละ 0.19) อาชีพ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างมากที่สุด รองลงมา คือ เกษตรกรรม, ว่าง งาน, ค้าขาย และแม่บ้าน (ร้อยละ 45.19, 21.21, 5.97, 4.48 และ 3.98 ตามลำดับ) อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน พบว่า ในปี พ.ศ.2547 ภาคเหนือ มีอัตราป่วยสูงสุด(อัตราป่วยเท่ากับ 26.47 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ ภาคกลาง (อัตราป่วยเท่ากับ 26.33 ต่อประชากรแสนคน) ภาคใต้ (อัตราป่วยเท่ากับ 20.03 ต่อประชากรแสนคน) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อัตราป่วยเท่ากับ 14.31 ต่อประชากรแสนคน) ปัจจัยเสี่ยง พบ จากการมีเพศสัมพันธ์ 216,752 ราย (ร้อยละ 83.78) ดิทยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 12,168 ราย (ร้อยละ 4.7) ติดเชื้อจากมารดา 10,796 ราย (ร้อยละ 4.16) และรับเลือด 61 ราย (ร้อยละ 0.02) โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ที่ได้รับรายงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ Mycobacterium tuberculosis ,Pulmonary or extrapulmonary 75,172 ราย (ร้อยละ 29.52) รองลงมาคือ โรคปอดบวมจากเชื้อ *Pneumocystis carinii* 54,255 ราย (ร้อยละ 21.32), *Cryptococcosis* 41,917 ราย (ร้อยละ 16.28), *Candidiasis* ของหลอดอาหาร หลอดลม (Trachea, bronchi) หรือปอด 13,499 ราย (ร้อยละ 5.28) และ Pneumonia recurrent (Bacteria) มากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี จำนวน 9,637 ราย (ร้อยละ 3.77) รายละเอียดอื่น ๆ ตามแผนภูมิ

จำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคเอดส์ จำแนกรายปี ตามปีที่เริ่มป่วย

ประเทศไทย พ.ศ. 2527 - 2547



ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย ก.ย. 2527 - 31 ธันวาคม 2547

