

เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคนี้ ส่วนในระยะยาวเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาบรรจุเรื่องเห็ดพิษในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในวงกว้าง และเพิ่มพูนทักษะในการดำรงชีวิตให้ปลอดภัยจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษเจือปน



รายงานการเฝ้าระวังโรคในชาวต่างชาติ, ประเทศไทย, มกราคม - ธันวาคม 2547

สถานการณ์โรค/ภัยที่สำคัญ

Reports of diseases surveillance of foreign national, Thailand,

January - December 2004

รายงานโดย สุวดี ตีวงษ์ ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2547 สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยต่างชาติรวม 19,261 ราย ตาย 37 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายน้อยละ 0.2 จำแนกเป็นผู้ป่วยแรงงานต่างชาติและครอบครัว 16,898 ราย ตาย 34 รายและชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาและนักท่องเที่ยว 2,363 ราย ตาย 3 ราย

จำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ป่วยชาย 10,920 ราย หญิง 8,341 ราย อัตราส่วนหญิงต่อชายเท่ากับ 1:1.3 ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี, 15 - 24 ปี และ 25 - 34 ปี การจำแนกตามเชื้อชาติพบว่า เป็นผู้ป่วยพม่ามากที่สุด (65.90%) รองลงมาได้แก่ ลาว กัมพูชา จีน มาเลเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ

โรคที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 7,005 ราย มาลาเรีย 4,832 ราย ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,844 ราย ปอดบวม 1,043 ราย และโรคฉี่หนู 580 ราย เมื่อจำแนกตามประเภทของผู้ป่วย พบว่า โรคที่มีรายงานสูงสุดในกลุ่มผู้ป่วยแรงงานต่างชาติและครอบครัวได้แก่ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน มาลาเรีย ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม และฉี่หนู โรคที่มีรายงานสูงสุดในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาและนักท่องเที่ยวได้แก่ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ปอดบวม ไข้ไม่ทราบสาเหตุ มาลาเรีย และไข้เลือดออก นอกจากนี้พบว่าผู้ป่วยชาวต่างชาติมีการป่วยด้วยโรคติดต่ออื่นที่สำคัญ ได้แก่ โรคตาแดง 30 ราย โรคสครับไทฟัส 9 ราย

พบว่า มีการรายงานผู้ป่วยต่างชาติจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศรวม 70 จังหวัด จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ กาญจนบุรี (4,150 ราย) ตาก (2,619 ราย) เชียงใหม่ (1,972 ราย) แบ่งเป็นจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยแรงงานต่างชาติและครอบครัวมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ กาญจนบุรี (4,063 ราย) ตาก (2,615 ราย) เชียงใหม่ (1,895 ราย) และจังหวัดที่รายงานผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาและนักท่องเที่ยวมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ กรุงเทพมหานคร (638 ราย) อุบลราชธานี (400 ราย) และเลย (267 ราย)

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดข้อมูลได้จากตารางใน http://epid.moph.go.th/home_menu_20002_1.html

รายงานชาวต่างชาติที่ป่วยด้วยโรคในข่ายงานเฝ้าระวัง, ประเทศไทย, มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2547

Reported cases and deaths of foreigner by diseases and type, Thailand, January - December, 2004

No.	Disease	Total		Migrants		Cross border& Foreigner	
		cases	deaths	cases	deaths	cases	deaths
Total		19261	37	16898	34	2363	3
1	Acute Diarrhoea	7005	1	5822	1	1183	0
2	Malaria	4832	13	4667	13	165	0
3	Pyrexia	1844	2	1642	2	202	0
4	Pneumonia	1043	9	830	8	213	1
5	Tuberculosis	580	4	519	3	61	1
6	Food Poisoning	582	0	482	0	100	0
7	H.conjunctivitis	587	0	557	0	30	0
8	S.T.D.	766	1	718	1	48	0
9	Chickenpox	265	1	244	0	21	1
10	D.H.F	431	0	288	0	143	0
11	Dysentery	251	0	228	0	23	0
12	Enteric fever	172	0	139	0	33	0
13	Influenza	151	0	130	0	21	0
14	Hepatitis,total	125	0	70	0	55	0
15	Snake bite	114	0	110	0	4	0
16	Physical Hazard	14	0	11	0	3	0
17	Mumps	53	0	52	0	1	0
18	Scrub Typhus	79	0	70	0	9	0
19	Measles,total	63	0	55	0	8	0
20	Occupational disease	46	0	42	0	4	0
21	Severe Diarrhoea	39	1	39	1	0	0
22	Suicide	41	1	38	1	3	0
23	Leprosy	12	0	12	0	0	0
24	Herpes zoster	37	0	33	0	4	0
25	Leptospirosis	38	1	25	1	13	0
26	Encephalitis	17	0	13	0	4	0
27	Meningitis,uns	12	2	10	2	2	0
28	Mushroom poisoning	14	0	11	0	3	0
29	Tetanus inc.Neo.	6	0	6	0	0	0
30	Drug poisoning	14	0	12	0	2	0
31	Meningococcal Meningitis	9	1	6	1	3	0
32	Hand,foot and mouth	3	0	3	0	0	0
33	Filariasis	5	0	5	0	0	0
34	Tropical ulcer	1	0	1	0	0	0
35	Rubella	6	0	5	0	1	0
36	Diphtheria	1	0	1	0	0	0
37	Acute Flaccid Paralysis	2	0	1	0	1	0
38	Amoebiasis other organ	1	0	1	0	0	0
39	Eosinophilic Meningitis	0	0	0	0	0	0
40	Yaw,infectious	0	0	0	0	0	0
41	Pertussis	0	0	0	0	0	0
42	Rabies	0	0	0	0	0	0
43	Trichinosis	0	0	0	0	0	0

Source :Center of Epidemiological Information,Bureau of Epidemiology,Department of Disease Control