



รายงาน

WESR

เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์

Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักงานโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859-547X

http://epid.moph.go.th/home_menu_20001.html

ปีที่ ๓๖ : ฉบับที่ ๒๒ : ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ Volume 36 : Number 22 : June 10, 2005

สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	54	55	66	65	62	66	63	57	62	68	65	58	65	56	59	55	60	63	64	57	66	64				

สัปดาห์ที่ 22 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2548

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

สัปดาห์ที่ 22 ส่งทันเวลา 64 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 84.21



เตรียมพร้อมรับมือโรคที่เป็นปัญหาในฤดูฝน โดยเฉพาะโรคเลปโตสไปโรซิส

สถานการณ์โรค/ภัย ที่สำคัญ

ผู้เรียบเรียง: สัตวแพทย์หญิงเสาวพัตร อิน้อย

สำนักงานโรค กรมควบคุมโรค

ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2548 ถึงเดือนพฤษภาคม สำนักงานโรค ได้รับรายงานโรคเลปโตสไปโรซิส จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 341 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต จาก 50 จังหวัด (ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคนี้ในเขต 7 ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม) คิดเป็นอัตราป่วย 0.54 ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 233 ราย ภาคเหนือ 47 ราย ภาคกลาง 35 ราย และภาคใต้ 26 ราย จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกได้แก่ กาฬสินธุ์ 58 ราย ขอนแก่น 34 ราย อุตรดิตถ์ 31 ราย ศรีสะเกษ 23 ราย สุรินทร์ 22 ราย นครราชสีมา 19 ราย ร้อยเอ็ด 18 ราย พะเยา 10 ราย และลพบุรี 9 ราย ถ้าเปรียบเทียบกับอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงที่สุด 10 จังหวัดแรกของประเทศจะเป็นดังรูปที่ 1


ฤดูกาลการระบาด ในช่วง 5 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2548 (มกราคม - พฤษภาคม) พบผู้ป่วยมากที่สุดในเดือนมกราคม 95 ราย และเริ่มลดลงจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้ว (รูปที่ 2) แม้ว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานนี้จะเป็นข้อมูลของจริง. 506 ที่ได้รับการคัดกรองการเข้าซื้อจากศูนย์ข้อมูลของสำนักงานโรคแล้ว แต่ยังขาดความครบถ้วนของข้อมูลจากบางจังหวัด ดังนั้น ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนจากสถานการณ์จริง อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาข้อมูลของโรคย้อนหลัง 5 ปี พบว่าผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน เช่นเดียวกับลักษณะการกระจายตัวของโรคในพื้นที่ ปี พ.ศ. 2547 พบว่าตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นมา จำนวนผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในแต่ละพื้นที่จนถึงจุดสูงสุดประมาณเดือนสิงหาคม




สารบัญ

◆ เตรียมพร้อมรับมือโรคที่เป็นปัญหาในฤดูฝน โดยเฉพาะโรคเลปโตสไปโรซิส	369
◆ สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 22 วันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2548	371
◆ รายงานการสอบสวนเบื้องต้นผู้ป่วยกลุ่มอาการสงสัยภาวะขาดวิตามินบี 1 (Beri Beri) จังหวัดสมุทรสาคร มีนาคม พ.ศ. 2548	374
◆ สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 18 - 25 เมษายน พ.ศ. 2548	375
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วน สัปดาห์ที่ 22 วันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2548	378
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จากบัตรรายงาน 506 ประจำเดือน พฤษภาคม 2548	385

รูปที่ 1 Reported Cases of Leptospirosis per 100,000 Population by province, Thailand, 2005



รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส จำแนกรายเดือน ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 - 2548 (ถึงเดือนพฤษภาคม)



เนื่องจากโรคเลปโตสไปโรซิส เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ที่มีสัตว์หลายชนิดเป็นแหล่งรังโรคที่สำคัญ โดยจะแพร่กระจายเชื้อผ่านทางปัสสาวะสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ แล้วติดต่อมาสู่คนได้โดยทางแผลที่ผิวหนัง ในระยะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝน มีฝนตกในหลายพื้นที่ อาจทำให้โรคระบาดได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนั้นการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และการสอบสวนโรคจะทำให้ป้องกันและควบคุมโรคได้ ทำให้อัตราป่วยและอัตราตายลดลง ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิสอย่างใกล้ชิด เมื่อได้รับรายงานผู้ป่วยต้องออกไปสอบสวนโรคทันทีเพื่อหาแหล่งโรคร่วม และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ควรมีการจัดประชุมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความรู้ทางวิชาการ เช่น วิธีการติดต่อ อาการของโรคและการวินิจฉัย การให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย การควบคุมป้องกันโรคในคน นอกจากนั้น ควรประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิสในปศุสัตว์ และการกำจัดทำลายหนู รวมทั้งการกำจัดเศษอาหารเพื่อลดการแพร่พันธุ์ของหนู และประชาสัมพันธ์ให้สุศึกษาแก่ประชาชนผ่านทางสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงอันตรายของโรค วิธีการติดต่อและแนวทางป้องกันควบคุมโรค