

ราย อายุ 18 เดือน – 40 ปี ในจำนวนนี้ เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายอายุ 40 ปี โดยโรคนี้มีเห็บเป็นพาหะ ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ใช้สูง ปวดข้อและหลัง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ตาแดง หน้าและคอแดง และมักจะมีจุดแดงที่เพดานปาก

2.2 การระบาดของโรคทางทวารในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งของเมือง Liou-He มณฑลหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พบผู้ป่วยในรอบเดือนที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 700 ราย ในขณะนี้ยังมียุโรปรายใหม่วันละ 10-20 ราย

2.3 การระบาดของโรคหิวตอดโรค ประเทศสาธารณรัฐแองโกลา ตั้งแต่ต้นปี 2549 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 พบผู้ป่วยรวม 35,775 ราย กระจายใน 18 จังหวัด ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,298 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ

3.6 การระบาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ประมาณวันละ 600 ราย

สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 20 ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2549

Situation of Priority by Disease Under Surveillance, 20th Week, May 14-20, 2006

บทฟื้นฟูวิชา

✍ รายงานโดย กนกทิพย์ ทิพย์รัตน์

กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ สำนักโรคระบาดวิทยา

✉ kanoktip@health.moph.go.th

สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์ที่ 20 พบว่า ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคคอตีบและโรคแอนแทรกซ์ ส่วนโรคอื่น ๆ เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1 จะพบว่า เกือบทุกโรคยังไม่มีสถานการณ์ที่ผิดปกติ คือ มีจำนวนผู้ป่วยและจำนวนผู้ป่วยสะสมในสัปดาห์ที่ 20 น้อยกว่าสัปดาห์เดียวกันนี้ในปีที่แล้ว และน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง(ปี 2544-2548) ยกเว้นอยู่ 3 โรค คือ โรคไอกรน ที่พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยสะสมมากกว่าสัปดาห์เดียวกันนี้ในปีที่แล้ว และมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง(ปี 2544-2548) ซึ่งได้นำเสนอสถานการณ์ไปแล้วในสัปดาห์ที่ 15 ว่า เกิดการระบาดใหญ่ที่จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยถึง 77 ราย ส่วนโรคปอดอักเสบที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แม้ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยในสัปดาห์ที่ 20 น้อยกว่าสัปดาห์เดียวกันนี้ในปีที่แล้ว และน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2544-2548) ก็ตาม แต่จำนวนผู้ป่วยสะสมกลับมากกว่าสัปดาห์เดียวกันของปีที่แล้ว และมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง(ปี 2544-2548) มาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 18 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เริ่มจะมีจำนวนผู้ป่วยสะสมมากกว่าปีก่อน ๆ จึงควรให้ความสนใจติดตามเฝ้าระวัง เนื่องจากอาการปอดอักเสบ เป็นหนึ่งในอาการหรือโรคแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่รุนแรง ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกกำลังเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเกรงว่า อาจจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนก ที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ ส่วนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่มีจำนวนผู้ป่วยและจำนวนผู้ป่วยสะสมในสัปดาห์ที่ 20 มากกว่าสัปดาห์เดียวกันนี้ในปีที่แล้ว และมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง(ปี 2544-2548) นั้น ขณะนี้อาจเนื่องจากการตื่นตัวและให้ความสนใจกับการรายงานผู้ป่วยมากขึ้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อการนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพการผลิตและความปลอดภัยของการให้บริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค