

Table III Summary - Identifications of specified bacterial and viral pathogens, Thailand, week ending March 12, 1983 (10th week)

Organism*	Identification (numbers)		provinces
	culture	gram stain/smear	
<u>V.cholerae</u> El Tor, Inaba	51		7
<u>V.cholerae</u> El Tor, Ogawa	-		-
<u>Salmonella typhi</u>	3		3
<u>Salmonella</u> spp. (Other serotype)	52		13
<u>E. Coli</u> (enteropathogenic)	10		5
<u>Shigella</u> spp.	82		23
<u>E. histolytica</u>	19		12
<u>V. parahaemolyticus</u>	123		18
<u>Staph. aureus</u>	4		2
<u>Streptococcus</u> group A, pneumoniae	21,22		7, 6
<u>Corynebacterium diphtheriae</u>	-		-
<u>Bordetella pertussis</u>	-		-
<u>Plasmodium</u> falc,vivax,unspecified	271,102,103		56
<u>Bacillus anthracis</u>	-		-
<u>Trichinella spiralis</u>	-		-
Rabies (fluorescent antibody technique)	23		4
*กองบริการชันสูตรสาธารณสุขภูมิภาค (ได้รับรายงานจากหน่วยชันสูตร 75 แห่ง)			
**สถาบันวิจัยไวรัส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์			
Total rectal swabs.done 3799			
Total throat swabs and sputums done 2041			
Total blood specimens for malarial parasite 10144			

ข่าวหนังสือพิมพ์ เรื่องอหิวาตกโรค ในบังคลาเทศ

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และหนังสือพิมพ์ภาษาไทยบางฉบับ ได้ลงข่าวเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๖ จะมียาอหิวาตกโรคระบาดทางภาคใต้ ของบังคลาเทศในระยะ ๖ วันที่แล้ว ทำให้มีผู้ป่วยประมาณ ๒,๐๐๐ ราย ตาย ๑๒๔ ราย พร้อมกับรายงานว่าคงมีผู้ป่วยและตายมากกว่านี้ กระทรวงสาธารณสุขบังคลาเทศได้ระดมแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งรัดควบคุมอย่างเต็มที่แล้ว ข่าวนี้แสดงว่าได้มียาอหิวาตกโรครุนแรงขึ้นในบังคลาเทศ ซึ่งมีโรคนี้อยู่เป็นประจำ

อายุ	ผู้บริโภคร		ผู้ป่วย		อัตราป่วย%	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
๓๕ - ๔๕	๓	๑	๓	-	๑๐๐.๐	-
๔๕ - ๕๕	-	๓	-	๒	-	๖๖.๗
๕๕	๓	๓	๒	๓	๖๖.๗	๑๐๐.๐
รวม	๒๔	๒๓	๑๘	๑๔	๗๕.๐	๖๐.๔

ทั้ง ๓๒ คนเริ่มป่วยหลังจากบริโภคเครื่องในตังกกล่าวตั้งแต่ ๑ - ๒๓ ชั่วโมง พบผู้ป่วยมากในช่วง ๑๓ - ๑๔ ชั่วโมง (๒๒ คน, ๖๙%) ๗๒% ของผู้ป่วย (๒๓ คน) ป่วยในวันที่ ๑๔ มกราคม ผู้ป่วยมีอาการอุจจาระร่วงทุกรายร่วมกับมีไข้เป็นส่วนใหญ่ ตารางที่ ๒ อาการป่วยผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ, บ้านหนองใหญ่

๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๒๖

อาการป่วย	จำนวน %
อุจจาระร่วง	๓๒ (๑๐๐)
ไข้	๒๙ (๙๑)
ปวดศีรษะ	๒๖ (๘๑)
ปวดท้อง	๒๐ (๖๓)
อาเจียร	๑๐ (๓๑)
ชก	๒ (๖)

๓๑ จาก ๓๒ คนให้ประวัติว่าเดินทางไปรักษาที่คลินิกหรือ โรงพยาบาลอำเภอ หรือโรงพยาบาลมหาราช นม. ถึง ๒๗ ราย (๘๗%) อีก ๔ รายปล่อยให้อาการดีขึ้นเอง

การติดตามผลการตรวจอุจจาระพบว่าผู้ป่วย ๗ คน ได้รับการตรวจอุจจาระและพบ Salmonella group B. ๑ ราย (๑๔%) เนื้อควายที่เหลือบริภคณ์นำส่งตรวจพบ Salmonella group B. เช่นกัน กำลังรอผลการตรวจ serotype เพิ่มเติมจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงเวลาเดียวกันไม่พบผู้ป่วยอุจจาระร่วงในกลุ่มผู้ไม่ได้บริโภค การติดตามเก็บอุจจาระผู้ป่วย และผู้บริโภครเครื่องในควายในอีก ๑๐ วัน ต่อมาหลังจากการระบาดส่งตรวจรวม ๑๔ รายไม่พบ Salmonella อีก

ผู้รายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

อันอาจจะเนื่องจากภาวะอากาศอานวยให้ ซึ่งก็อาจจะมีความคล้ายกันนี้ในประเทศไทยได้ เช่นกัน จึงจำเป็นต้องเร่งรัดเฝ้าระวังโรคเพื่อค้นหาแหล่งอหิวาตกโรคให้ได้ทันทั่วถึง เพื่อควบคุมมิให้ลุกลามออกไปจนยากแก่การควบคุมและเป็นการระบาดรุนแรงต่อไปได้

รายงานโรคติดต่ออันตรายจาก Weekly Epidemiological Record No. 9
ฉบับวันที่ ๔ มีนาคม ๑๙๘๓ ของ WHO มีดังนี้

อหิวาตกโรค					
เอเชีย	ป่วย	ตาย	แอฟริกา	ป่วย	ตาย
มาเลเซีย	๑๓-๑๙ มีนาคม ๔	๐	โมซัมบิก	๒๒-๒๘ มกราคม ๑๒๕๖	๕๒
ศรีลังกา	๑- ๗ มกราคม ๑	๐			

กาฬโรค	
แอฟริกา	ป่วย ตาย
มาดากาสการ์	๓๑ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ์ ๑ ๑

กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวง DIVISION OF EPIDEMIOLOGY
กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR
PUBLIC HEALTH, MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
ประเทศไทย โทร. ๒๕๒๑๔๘๗, ๒๕๒๔๔๒๔ BANGKOK 10200, THAILAND

ใบรายการกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สส. ๐๒๑๒/พิเศษ

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 6/2522
พ.ท. วัชรเวรณ

Ch. S. S.