

รายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์

VOLUME 14 NUMBER 12

APRIL 1, 1983

สถานการณ์โรค	133
การระบาดของภาวะขาดอาหาร	
นครราชสีมา	134
รายงานโรคติดต่ออันตราย	144

EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

สถานการณ์โรค

สถานการณ์อหิวาตกโรค สัปดาห์ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๖ ได้รับรายงานผู้ป่วย ๔๕ ราย ตาย ๓ ราย จาก ๑๔ จังหวัด เป็นผู้ป่วยที่มีวันเริ่มป่วยระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๕๕ ราย ตาย ๓ ราย วันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๔ ราย และวันที่ ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒ ราย จังหวัดที่รายงานผู้ป่วยใหม่ในสัปดาห์นี้ คือ

- กรุงเทพมหานคร ๑๒ ราย ตาย ๑ ราย ที่เขตพระโขนง เขตป้อมปราบ เขตละ ๒ ราย เขตบางเขน ๒ ราย ตาย ๑ ราย ที่ถึงแก่กรรมเป็นเด็กหญิงอายุ ๓ ปี ตายที่ O.P.D. ของโรงพยาบาลบำราศนราดูร นอกจากนี้ที่เขตดุสิต เขตยานนาวา เขตห้วยขวาง เขตบางกอกน้อย เขตภาษีเจริญ และเขตราชบุรี ๑ ราย

- สมุทรปราการ ๑๔ ราย ที่อำเภอเมือง ๔ ราย อำเภอพระประแดง ๔ ราย และอำเภอบางพลี ๑ ราย

- สุราษฎร์ธานี ๑๔ ราย ที่อำเภอเมือง ๔ ราย อำเภอบ้านนาสาร ๒ ราย อำเภอพนม อำเภอพุน อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอท่าฉาง อำเภอละ ๑ ราย

- นนทบุรี ๑๐ ราย ที่อำเภอเมือง ๕ ราย อำเภอปากเกร็ด ๒ ราย อำเภอไทรน้อย ๒ ราย และอำเภอบางกรวย ๑ ราย

- สมุทรสงคราม ๔ ราย ที่อำเภอเมือง ๕ ราย อำเภออัมพวา ๒ ราย และอำเภอบางคนที ๑ ราย

- ปัตตานี ๗ ราย ที่อำเภอเมือง ๔ ราย อำเภอยะหริ่ง ๒ ราย และอำเภอสายบุรี ๑ ราย

- นครราชสีมา ๕ ราย ตาย ๑ ราย ที่อำเภอเมือง ๓ ราย ตาย ๑ ราย รายที่ตายเป็นหญิงอายุ ๗๔ ปี ตายที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่อำเภอพิมาย และอำเภอจักราช อำเภอละ ๑ ราย

- นครศรีธรรมราช ๔ ราย ที่อำเภอเมือง ๓ ราย และอำเภอพิปูน ๑ ราย
 - ปทุมธานี ๓ ราย ที่อำเภอสามโคก ๒ ราย และอำเภอลำลูกกา ๑ ราย
 - สมุทรสาคร ๒ ราย ที่อำเภอบ้านแพ้วทั้ง ๒ ราย
 - เพชรบุรี ๒ ราย ที่อำเภอบ้านแหลมทั้ง ๒ ราย
 - อุดรธานี ๒ ราย ที่อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอผักไห่ อำเภอละ ๑ ราย
 - ชลบุรี ๑ ราย และถึงแก่กรรมที่กิ่งอำเภอเกาะสีชัง รายนี้ยังไม่ทันได้รับการรักษา
- เป็นเด็กหญิงอายุ ๑ ปี ตายที่บ้านผู้ป่วย
- ร้อยเอ็ด ๑ ราย ที่อำเภอธวัชบุรี

รวมผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีทั่วประเทศป่วย ๔๒๒ ราย ตาย ๑๒ ราย

การระบาดของภาวะขาดอาหาร, จังหวัดนครราชสีมา

ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๒๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๒๔-กันยายน ๒๕๒๕ ศูนย์โภชนาการเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการสำรวจและแผ้วระวังติดตามภาวะโภชนาการของทารกและเด็กในวัยก่อนเรียน (๐-๑๑ เดือนและ ๑๒-๕๔ เดือน) ในจังหวัดนครราชสีมา รวม ๒๕,๓๔๔ คนใน ๔๒๔ หมู่บ้าน (๑๗ % ของหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัด) ซึ่งแยกเป็นเด็กในหมู่บ้านพื้นที่ปกติ รวม ๔๖๐๑ คน (๑๕๐ หมู่) และเด็กในหมู่บ้านพื้นที่ยากจนรวม ๑๔๓๔๔ คน (๒๕๗ หมู่, ๗๑.๖ % ของหมู่บ้านพื้นที่ยากจนทั้งหมด) ที่เหลืออีก ๑๓๔๔ คนมาจาก ๑๗ หมู่บ้านซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลอำเภอ ๑๓ แห่ง (ตารางที่ ๑)

การสำรวจพบว่าเด็กทารกมีภาวะขาดอาหาร (รวมทุกระดับ) น้อยกว่าเด็กในวัยก่อนเรียนในทุกพื้นที่ (๒๖.๓-๓๔ % ในเด็กทารก, ๔๓.๓-๖๑.๖ % ในเด็กในวัยก่อนเรียน, $P < 0.05$ ทุกพื้นที่) ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบเด็กทารกในหมู่บ้านพื้นที่ปกติกับทารกในหมู่บ้านพื้นที่ยากจนและเด็กในวัยก่อนเรียนในทั้ง ๒ พื้นที่พบว่าเด็กทารกและเด็กในวัยก่อนเรียนในพื้นที่ปกติจะมีภาวะขาดอาหารน้อยกว่าเด็กทารกหรือเด็กในวัยก่อนเรียนในพื้นที่ยากจนเช่นกัน (๒๖.๓ และ ๓๗ % สำหรับเด็กทารก $P < 0.05$ และ $\hat{RR}$ ๑.๖ ๔๓.๓ และ ๕๔.๖ % สำหรับเด็กในวัยก่อนเรียนใน ๒ พื้นที่ดังกล่าว, $P < 0.05$ และ