

- นครศรีธรรมราช ๔ ราย ที่อำเภอเมือง ๓ ราย และอำเภอพิปูน ๑ ราย
- ปทุมธานี ๓ ราย ที่อำเภอสามโคก ๒ ราย และอำเภอลำลูกกา ๑ ราย
- สมุทรสาคร ๒ ราย ที่อำเภอบ้านแพ้วทั้ง ๒ ราย
- เพชรบุรี ๒ ราย ที่อำเภอบ้านแหลมทั้ง ๒ ราย
- อยุธยา ๒ ราย ที่อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอผักไห่ อำเภอละ ๑ ราย
- ชลบุรี ๑ ราย และถึงแก่กรรมที่กิ่งอำเภอเกาะสีชัง รายนี้ยังไม่ทันได้รับการรักษา  
เป็นเด็กหญิงอายุ ๑ ปี ตายที่บ้านผู้ป่วย
- ร้อยเอ็ด ๑ ราย ที่อำเภอธวัชบุรี

รวมผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีทั่วประเทศป่วย ๔๒๒ ราย ตาย ๑๒ ราย

การระบาดของภาวะขาดอาหาร, จังหวัดนครราชสีมา

ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๒๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๒๔-กันยายน ๒๕๒๕ ศูนย์  
โภชนาการเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
ได้ดำเนินการสำรวจและเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการของทารกและเด็กในวัยก่อน  
เรียน (๐-๑๑ เดือนและ ๑๒-๕๔ เดือน) ในจังหวัดนครราชสีมา รวม ๒๕,๓๔๔ คนใน  
๔๒๔ หมู่บ้าน (๑๗ % ของหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัด) ซึ่งแยกเป็นเด็กในหมู่บ้านพื้นที่ปกติ  
รวม ๔๖๐๑ คน (๑๕๐ หมู่) และเด็กในหมู่บ้านพื้นที่ยากจนรวม ๑๔๓๔๔ คน (๒๕๗ หมู่,  
๗๑.๖ % ของหมู่บ้านพื้นที่ยากจนทั้งหมด) ที่เหลืออีก ๑๓๘๕ คนมาจาก ๑๗ หมู่บ้านซึ่งอยู่  
ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลอำเภอ ๑๓ แห่ง (ตารางที่ ๑)

การสำรวจพบว่าเด็กทารกมีภาวะขาดอาหาร (รวมทุกระดับ) น้อยกว่าเด็กในวัย  
ก่อนเรียนในทุกพื้นที่ (๒๖.๓-๓๔ % ในเด็กทารก, ๔๓.๓-๖๑.๖ % ในเด็กในวัยก่อนเรียน,  
 $P < 0.05$  ทุกพื้นที่) ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบเด็กทารกในหมู่บ้านพื้นที่ปกติกับ  
ทารกในหมู่บ้านพื้นที่ยากจนและเด็กในวัยก่อนเรียนในทั้ง ๒ พื้นที่พบว่าเด็กทารกและเด็ก  
ในวัยก่อนเรียนในพื้นที่ปกติจะมีภาวะขาดอาหารน้อยกว่าเด็กทารกหรือเด็กในวัยก่อนเรียน  
ในพื้นที่ยากจนเช่นกัน (๒๖.๓ และ ๓๗ % สำหรับเด็กทารก  $P < 0.05$  และ  $\hat{RR}$  ๑.๖  
๔๓.๓ และ ๕๘.๖ % สำหรับเด็กในวัยก่อนเรียนใน ๒ พื้นที่ดังกล่าว,  $P < 0.05$  และ

