

รายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

กองการโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ

ชนิดของกาโรค	จำนวนผู้ป่วยกาโรค(ราย)			รวมตั้งแต่ต้นปี
	ชาย	หญิง	รวม	
๑. ชิฟิลิส	๔๔๕	๒๕๖	๗๐๑	๒๓๖๔
๑.๑ ชิฟิลิสระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒	๑๖๘	๓๓	๒๐๑	๖๐๖
๑.๒ ชิฟิลิสระยะอื่น ๆ	๓๒๗	๒๒๓	๕๕๐	๑๗๖๓
๒. หนองใน	๔,๑๔๕	๕,๔๓๒	๙,๕๗๗	๔๓,๐๒๔
๒.๑ ไม่มีอาการแทรก	๘,๔๕๓	๕,๒๐๔	๑๓,๖๕๗	๔๐,๒๐๓
๒.๒ มีอาการแทรก	๖๙๒	๒๒๘	๙๒๐	๒,๘๒๑
๓. แผลริมอ่อน	๓,๔๔๔	๓๘๐	๓,๘๒๔	๑๑,๒๔๗
๔. กาโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	๔๗๑	๑๐๔	๕๗๕	๓,๐๐๗
๕. หนองในเทียม	๓,๘๗๒	๒,๐๘๒	๕,๙๕๔	๑๗,๓๖๕
รวมทั้งสิ้น	๑๘,๐๓๒	๘,๒๕๔	๒๖,๒๘๖	๗๗,๐๖๗

หมายเหตุ กองการโรค ได้รับรายงานประจำเดือนจากหน่วยงานกาโรคทั่วประเทศ ดังนี้

๑. สถานกาโรคส่วนกลาง ๘ แห่ง (ขาดส่ง ๓ แห่ง)
๒. ศูนย์กาโรคเขตฯ ๔ ศูนย์ (๑๕ หน่วยงาน)
๓. หน่วยงานกาโรคจังหวัด ๕๒ จังหวัด (ขาดส่ง ๑๐ จังหวัด)
๔. สำหรับรายงานที่ขาดส่งจะรวบรวมสมทบในเดือนต่อไป

รายงานโรคติดต่ออันตราย

อหิวาตกโรค

เอเชีย	ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย
มาเลเซีย ๓-๔ เม.ย.	๔๗	๑	สิงคโปร์ ๓-๔ เม.ย.	๑
อินโดนีเซีย ๓ ต.ค.-๓๑ ธ.ค. ๒๖๗๒	๒๕๔๘	๑	อินเดีย ๒๗ ก.พ.-๑๔ มี.ค. ๒๔๔	๕

r = Revised figures

แอฟริกา	ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย
โมแซมบิก ๑๔-๒๕ มี.ค.	๑๓๐	๓	ชาอีร์ ๒-๒๒ มี.ค.	๑๐๐