


การระบาดของโรคทริคิโนสิสใน ต.เวียง และ ต.ฝายกวาง มีความแตกต่างกันที่น่าสนใจ คือ ปริมาณเนื้อหมูที่บริโภคต่อคนใน ต.ฝายกวาง มีมากกว่าใน ต.เวียง ผู้ป่วยใน ต. ฝายกวาง ที่เริ่มป่วยด้วยอาการทางระบบทางเดินอาหารมีจำนวนมากกว่าใน ต.เวียง ผู้ป่วยใน ต. ฝายกวาง มีการป่วยที่รุนแรงกว่าใน ต. เวียง ดูได้จากจำนวนที่เข้าโรงพยาบาล และผู้เสียชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อที่บริโภค หรือจำนวนพยาธิที่รับประทานเข้าไปกับอาการและความรุนแรงของโรค น่าจะได้รับความสนใจศึกษาต่อไป

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, ศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือ จังหวัดลำปาง,

โครงการศึกษาและฝึกอบรมในสาขาระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

รูปที่ ๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคทริคิโนสิส ในต.ฝายกวาง ตามเวลาเริ่มป่วย



□ ผู้ที่เริ่มป่วยด้วยอาการในระบบทางเดินอาหาร

▨ ผู้ที่เริ่มป่วยด้วยอาการทางกล้ามเนื้อ

การระบาดของโรคทริคิโนสิส - จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๖ ได้เกิดการระบาดของโรคทริคิโนสิสขึ้นที่ บ.พ่อ หมู่ที่ ๓ และ บ.นาทราย หมู่ที่ ๒ ต.แสนทอง อ.ท่าวัง ผา จ.น่าน มีผู้ป่วยรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๖๔ ราย (๖๐ ราย ใน บ.พ่อ ๒ ราย ใน บ.นาทราย และอีก ๒ ราย เป็น คณะครูฝึกอบรม อพป. ในบ.พ่อ ในขณะนั้น) ผู้ป่วยมีประวัติกินลาบดิบ ซึ่งปรุงจากเนื้อหมู ตัวหนึ่งก่อนมีอาการป่วย หมูตัวนี้มีผู้ซื้อมาจาก บ.สันติสุข ต.แสนทอง อ.ท่าวัง ผา และ ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเจ้าของหมูซื้อมาจากชาวเขาเผ่าม้ง บ.คอยเท็ก ซึ่งอยู่ติดกับ บ.สันติสุข มาอีกต่อหนึ่ง ผู้ป่วยทั้งหมดมีอาการคล้ายกัน คือมีอาการปวดกล้ามเนื้อ เป็นไข้ บวมตามกล้ามเนื้อและหน้า บางรายมีอาการท้องร่วงนำมาก่อน ผู้ป่วยที่มีอาการมากบางรายได้รับการเจาะกล้ามเนื้อตรวจและพบตัวอ่อนของพยาธิ *Trichinella spiralis* ทั้ง ๖๔ ราย ไม่มีผู้ใดเสียชีวิต

ผู้รายงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน