

- สุราษฎร์ธานี ๑๑ ราย ที่อำเภอเมือง ๓ ราย อำเภอบ้านนาสาร ๓ ราย อำเภอพุนพิน ๓ ราย อำเภอเคียนซา และอำเภอกีรีรัฐนิคม อำเภอละ ๑ ราย
- ยะลา ๒ ราย ที่อำเภอเบตง และกิ่งอำเภอธารโต แห่งละ ๑ ราย
- นครศรีธรรมราช ๑ ราย ที่อำเภอเมือง
- พัทลุง ๑ ราย ที่กิ่งอำเภอตะโหมด
- ปัตตานี ๑ ราย ที่อำเภอหนองจิก

รวมผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีทั่วประเทศป่วย ๙๓๒ ราย ตาย ๒๐ ราย

ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วง - จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๖ มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยอาการอุจจาระร่วงหนึ่งราย ในหมู่ที่ ๔ ต.ยางคลาน อ.โพทะเล ผู้ป่วย อายุ ๕๙ ปี เริ่มป่วยเมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๖ ด้วยอาการปวดท้อง คลื่นไส้ และอุจจาระร่วงญาติผู้ป่วยพาไปปรึกษากับหมอชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับน้ำเกลือทางเส้นเลือด ๕๐๐ ซี.ซี. ร่วมกับยากิน ๓ ชนิด คือ Sulfaguanidine, Kemicitin และ Chloracition ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในเวลาต่อมา การสอบสวนโรคเริ่มต้นขึ้นสองวันหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตได้เก็บตัวอย่างอุจจาระผู้สัมผัสในครอบครัวรวม ๕ ราย พร้อมทั้งเก็บน้ำดื่ม น้ำใช้ส่งตรวจ ผลการตรวจอุจจาระผู้สัมผัสทั้ง ๕ ราย ไม่พบเชื้ออหิวาตกโรค ส่วนน้ำยังไม่มียารายงานผลการตรวจ

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการศึกษา prevalence ของภาวะนอนพยาธิในหมู่บ้านสุขภาพตัวอย่างและหมู่บ้านทั่วไป

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๕ กองสุขภาพ กรมอนามัย, กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ และกองระบาดวิทยา ได้ร่วมกันดำเนินการศึกษา prevalence ของภาวะนอนพยาธิระหว่างหมู่บ้านสุขภาพตัวอย่าง และหมู่บ้านทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น สำหรับหมู่บ้านสุขภาพตัวอย่าง คือ หมู่ที่ ๑๖ บ.เปิด ต.เมืองเก่า อ.เมือง ซึ่งได้เริ่มงานปรับปรุงด้านสุขภาพภายใต้โครงการพิเศษของศูนย์สุขภาพเขต ในหมู่บ้านมาเป็นเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ สำหรับหมู่บ้านทั่วไปมีการดำเนินงานด้านสุขภาพอยู่แล้ว แต่อยู่ในลักษณะของงานประจำ ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงการพิเศษ คือ หมู่ที่ ๖ บ.แดงน้อย ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง มีจำนวนประชากรและลักษณะหมู่บ้านคล้ายคลึงกับ บ.เปิด

ทั้ง บ.เปิด และ บ.แดงน้อย พบ prevalence ของพยาธิใบไม้และพยาธิปากขอสูง (ตารางที่ ๑ และ ๒)

ตารางที่ ๑ prevalence ของหนอนพยาธิในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ

บ.เปิด ด.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น กรกฎาคม ๒๕๒๕

พยาธิ	รวม (%)	กลุ่มอายุ (%)					
		๐-๔	๕-๙	๑๐-๑๔	๑๕-๑๙	๒๐-๒๔	๒๕-๒๙
พยาธิปากขอ	๒๐๓(๒๗)	๓(๕)	๑๙(๒๔)	๓๔(๒๗)	๓๔(๔๐)	๑๕(๒๗)	๑๔(๒๕)
พยาธิใบไม้ในตับ	๕๖๐(๗๕)	๑๑(๑๗)	๓๘(๕๙)	๙๒(๗๒)	๗๕(๘๘)	๔๕(๘๐)	๕๐(๙๑)
พยาธิใบไม้ในลำไส้	๒๙๖(๔๐)	๒(๓)	๑๔(๑๘)	๔๓(๓๔)	๔๐(๔๗)	๒๔(๔๓)	๒๔(๔๔)
พยาธิตัวตืด	๔๔(๖)	-	-	๕(๔)	๔(๕)	๓(๕)	๕(๙)
พยาธิเข็มหมุด	๑๘(๒)	-	-	๓(๒)	๒(๒)	๓(๕)	๑(๒)
พยาธิเข็มหมุด	๕(๑)	-	๑(๑)	๒(๑)	-	-	๑(๒)
พยาธิไส้เดือน	๒(๐.๓)	-	๒(๓)	-	-	-	-
ประชากรที่ได้รับการตรวจ	๗๔๘	๖๓	๗๘	๑๒๘	๘๕	๕๖	๕๕
ประชากรทั้งหมด	๘๖๘	๖๖	๘๘	๑๔๒	๑๒๑	๗๖	๖๓

ตารางที่ ๒ prevalence ของหนอนพยาธิในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ

บ.แดงน้อย ด.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น, กรกฎาคม ๒๕๒๕

พยาธิ	รวม (%)	กลุ่มอายุ (%)					
		๐-๔	๕-๙	๑๐-๑๔	๑๕-๑๙	๒๐-๒๔	๒๕-๒๙
พยาธิปากขอ	๒๑๑(๒๙)	๔(๕)	๒๕(๒๕)	๓๓(๒๙)	๑๙(๒๘)	๑๔(๔๐)	๑๔(๓๐)
พยาธิใบไม้ในตับ	๔๕๕(๖๑)	๕(๗)	๒๘(๒๗)	๖๖(๕๕)	๔๔(๖๖)	๒๘(๘๐)	๓๗(๗๙)
พยาธิใบไม้ในลำไส้	๑๗๕(๒๔)	-	๑๕(๑๕)	๓๒(๒๗)	๑๘(๒๗)	๑๐(๒๙)	๒๐(๔๓)
พยาธิตัวตืด	๑๔(๒)	-	-	-	๑(๑)	๑(๓)	-
พยาธิเข็มหมุด	๔(๐.๕)	๑(๑)	๒(๒)	-	-	-	-
พยาธิเข็มหมุด	๒(๐.๓)	-	๑(๑)	๑(๑)	-	-	-
พยาธิไส้เดือน	๑(๐.๑)	-	-	-	-	-	-
ประชากรที่ได้รับการตรวจ	๗๔๐	๗๖	๑๐๒	๑๑๙	๖๗	๓๕	๔๗
ประชากรทั้งหมด	๘๒๕	๘๓	๑๑๔	๑๔๓	๑๐๖	๖๕	๖๓

ในปี ๒๕๒๖ จะได้ดำเนินการศึกษา prevalence ของภาวะหนอนพยาธิในหมู่บ้านทั้งสองนี้ต่อ
 ผู้รายงาน: กองสุขาภิบาล กรมอนามัย, กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ, กองระบาดวิทยา
 (พยาธิปากขอ = hookworms, พยาธิใบไม้ในตับ = Opisthorchis viverrini, พยาธิใบไม้
 ในลำไส้ = intestine flukes พยาธิตัวตืด = Taenia spp., พยาธิเข็มหมุด = Enterobias

vermicularis, พยาธิเข็มหมุด = Trichuris trichiura และพยาธิไส้เดือน
= Ascaris lumbricoides)

การเฝ้าระวังอหิวาตกโรค จังหวัดนครราชสีมา, มกราคม - มีนาคม ๒๕๒๖

ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม (๓๐ มีนาคม) ๒๕๒๖ มีรายงานผู้ป่วยอหิวาตกโรค
รวมทั้งหมด ๑๔ ราย เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วซึ่งไม่มีรายงานผู้ป่วยเลย จะเห็น
ได้ว่าการแพร่กระจายของเชื้ออหิวาต์ในปีี้เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วกว่า

จำนวนผู้ป่วยค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจาก ๓ รายในเดือนมกราคม เป็น ๑๐ ราย ในเดือน
มีนาคม รวมทั้งท้องที่ที่เกิดโรคเพิ่มจาก ๒ อำเภอเป็น ๕ อำเภอในช่วงเดียวกัน (ตารางที่ ๑)
แสดงถึงแนวโน้มที่อาจจะมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงต่อไป

ตารางที่ ๑ จำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจากอหิวาตกโรคแยกเป็นรายเดือนและท้องที่
เกิดโรค จังหวัดนครราชสีมา

	จำนวนผู้ป่วย	ผู้เสียชีวิต	ท้องที่เกิดโรค
มกราคม	๓	๑	โนนไทย (๒), จักราช(๑)
กุมภาพันธ์	๖	๑	เมือง(๒), ปักธงชัย(๒), พิมาย(๑) โชคชัย (๑),
มีนาคม	๑๐	๑	เมือง (๕), จักราช(๒), สีคิ้ว(๑) พิมาย(๑), โนนไทย(๑)
รวม	๑๙	๓	๗ จากทั้งหมด ๒๑ อำเภอ

จำนวนผู้เสียชีวิต ๓ ราย จากผู้ป่วยทั้งหมด ๑๙ ราย คิดเป็นอัตราตายจากป่วย
ร้อยละสูงถึง ๑๖ % ตัวเลขนี้ไม่ควรจะเกิน ๑ - ๓ % ในสถานรักษาพยาบาลสมัยใหม่
โดยทั่วไป แสดงให้เห็นว่าน่าจะยังมีปัญหาบางประการในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคนี้
ในจังหวัด

ผลการทดสอบความไวของเชื้ออหิวาต์จากผู้ป่วยทั้ง ๑๔ รายชั้นต้น ที่ศูนย์วิทยา-
ศาสตร์การแพทย์เขต ๓ จ.นครราชสีมา พบว่าเชื้อทุกตัวยังคงไวต่อยาปฏิชีวนะที่ใช้กันโดย
ทั่วไปเช่น เตตราไซคลิน

ทั้ง ๑๔ รายได้รับการสอบสวนโรคไปแล้วทุกราย ในจำนวนนี้ทราบผลการสอบสวน
โรคเรียบร้อยแล้ว ๑๔ ราย จากผู้ป่วย ๑๔ รายดังกล่าวพบพาหะของเชื้ออหิวาต์ในผู้สัมผัส