

รายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์

VOLUME 14 NUMBER 45
NOVEMBER 18, 1983

สถานการณ์อหิวาตกโรค	572
ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า- พค-สค	572
รายงานลอบส่วนโรคไข้มองอีกเล่ม จ.สุรินทร์	582
รายงานโรคติดต่ออันตราย	583

EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

สถานการณ์อหิวาตกโรค สัปดาห์ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ได้รับรายงานผู้ป่วย ๖ ราย ไม่มีตาย จาก ๕ จังหวัด เป็นผู้ป่วยที่มีวันเริ่มป่วยระหว่างวันที่ ๖-๑๒ พฤศจิกายน ๒ ราย วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๓ ราย และวันที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคม ๑ ราย จังหวัดที่รายงานผู้ป่วยรายใหม่เข้ามาในสัปดาห์นี้ คือ.-

- กรุงเทพมหานคร ๒ ราย จากเขตพระโขนง และเขตห้วยขวาง เขตละ ๑ ราย
- สมุทรปราการ ๑ ราย ที่อำเภอเมือง
- จันทบุรี ๑ ราย ที่อำเภอแหลมสิงห์
- ตรัง ๑ ราย ที่อำเภอเขาสมิง
- ระนอง ๑ ราย ที่อำเภอระอุ

รวมผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีทั่วประเทศ ป่วย ๑๔๗๕ ราย ตาย ๔๑ ราย

ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า, พฤษภาคม-สิงหาคม

มีรายงานการสอบสวนโรคผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ๔ ราย จาก

๔ จังหวัด

รายที่ ๑ ผู้ป่วยเป็นหญิงไทยอายุ ๓๕ ปี อยู่ที่ ต.ท่าโรงช้างอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ถูกสุนัขอายุประมาณ ๖ เดือนกัดที่เท้าขวา เมื่อสามเดือนก่อน ผู้ป่วยไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๖ เริ่มป่วยด้วยอาการปวดหลัง, กลืนน้ำไม่ได้, อุกกลืนไม่ได้, เกร็ง, กล้ามเนื้อสั่นและเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ศพฝังชั่วคราวหลังจากกักเด็กหญิงอีกคนหนึ่งได้มีผู้จับสัตว์ส่งตรวจ และพบเชื้อพิษสุนัขบ้า

- ๑) การทำความสะอาดแผลเบื้องต้นเพื่อลดหรือขจัดจำนวนไวรัสที่ปนเปื้อนอยู่ภายในแผล
- ๒) การทำลายไวรัสที่ปนเปื้อนอยู่ภายในแผลด้วยการให้ rabies immune globulin (RIG) หรือ antirabies serum ในทันที (๒๐ และ ๔๐ Unit ต่อน้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัมตามลำดับ) และ
- ๓) การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการให้ rabies vaccine ต่อหลังจาก ๑) และ ๒) แล้ว การให้เฉพาะตัววัคซีน โดยไม่ทำความสะอาดให้ถูกต้องและ
ไม่ให้ RIG หรือ antirabies serum ในทันที ไม่เป็นหลักประกัน
เพียงพอว่าจะป้องกันโรคนี้ได้