

รายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์

VOLUME 14 NUMBER 49

DECEMBER 16, 1983

สถานการณ์อหิวาตกโรค	624
แผนการรักษากามโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	624
รายงานโรคติดต่ออันตราย	639

EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

สถานการณ์อหิวาตกโรค สัปดาห์ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยจากจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเดียวมีผู้ป่วย ๓ ราย ไม่มีตาย เป็นผู้ป่วยจากอำเภอเมือง ๑ ราย และอำเภอพระประแดง ๒ ราย มีวันเริ่มป่วยในสัปดาห์นี้ทั้งหมด ทำให้ผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีทั่วประเทศป่วย ๑๔๕๕ ราย ตาย ๔๑ ราย รายล่าสุดป่วยเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

แผนการรักษากามโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ก้องกามโรค กรรมควบคุมโรคติดต่อ

ซิฟิลิส

ซิฟิลิสระยะแรก ได้แก่
(EARLY SYPHILIS)

ซิฟิลิสระยะที่ ๑ (PRIMARY SYPHILIS)

ซิฟิลิสระยะที่ ๒ (SECONDARY SYPHILIS)

ซิฟิลิสระยะแฝงไม่เกิน ๒ ปี (EARLY LATENT SYPHILIS)

การรักษา

ให้ฉีดยาอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ากล้ามเนื้อ ได้แก่

๑. โพร คนเพนนิซิลลิน ชนิดละลายในน้ำกลั่น

(AQUEOUS PROCAINE PENICILLIN)

- ๖๐๐,๐๐๐ ยูนิต วันละครั้ง นาน ๑๐ วัน รวมทั้งสิ้น ๖ ล้านยูนิต

๒. โพรเคนเพนนิซิลลินในน้ำมัน (PAM)

- ๒.๔ ล้านยูนิต ครั้งหนึ่ง และติดตามด้วย ๑.๒ ล้านยูนิต

ต่อมาอีก ๓ ครั้ง ในระยะ ๓ วัน ต่อครั้ง (เว้น ๒ วัน ฉีดยาครั้งหนึ่ง)

รวมทั้งสิ้น ๖ ล้านยูนิต