

ถึงเวลารับประทาน เพราะ Staph aureus สามารถเจริญมีจำนวนมากพอที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป ที่อุณหภูมิ 4 - 60° C เช่นในการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษครั้งนี้ เกิดจาก แอแคลร์ที่เก็บไว้ค้างคืนโดยไม่แช่ตู้เย็น

ผู้รายงาน นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรันทราวัต โครงการฝึกอบรมแพทย์ทางสาขาระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา

รายงานย่อ

อหิวาตกโรค - กาญจนบุรี Eltor cholera - Kanchanaburi

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2527 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาว่า ตรวจพบเชื้ออหิวาตกโรค Biotype Eltor, Serotype Inaba จากผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 50 ปี อาชีพทำไร่ อยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง กาญจนบุรี เริ่มป่วย 3 ตุลาคม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 4 ตุลาคม ทราบผลการตรวจจุลจากระ 5 ตุลาคม และถึงแก่กรรมเมื่อ 6 ตุลาคม

จากการเดินทางไปสอบสวนโรคที่บ้านของผู้ป่วย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ได้ทราบว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำเกินกว่า 20 ครั้ง อาเจียน เป็นตะคริว ตามกล้ามเนื้อ มีไข้ ปวดศีรษะ เหงื่อออกมากและซารอบปาก เข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่สถานอนามัยบ้านยาง ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน แต่อาการไม่ดีขึ้น ญาติจึงนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ในวันเดียวกัน จากการสอบสวนโรคทราบว่าก่อนป่วย 2 วัน เดินทางไปกรุงเทพมหานคร บริเวณใกล้เคียงบ้านผู้ป่วยไม่มีผู้ป่วยอหิวาตกโรคมาก่อน จากการทำ Rectal swab ผู้สัมผัส 9 ราย ไม่พบเชื้ออหิวาตกโรค หลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคแล้ว ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้อีก

ผู้รายงาน - เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี