

การได้รับสารตะกั่วในปริมาณที่สูงกว่าปกติในระยะเวลายาวนาน อาการพิษจะค่อย ๆ เกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนถึงขีดที่แสดงอาการให้เห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ชักโดยไม่มีสาเหตุอื่น ในเด็กปวดท้อง, ซีด, ขาและกล้ามเนื้ออ่อนเพลีย เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

- (1) รายงานการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์ : ปัญหาการเกิดพิษจากตะกั่ว
15(25) : 335, 1984

ข่าว AIDS ทั่วโลก

เอธิโอเปีย

ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2529 ไม่มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ในเอธิโอเปีย อย่างไรก็ตามประเทศเอธิโอเปียก็ได้เพิ่มความสนใจและระมัดระวัง โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนและจัดการประชุมวิชาการและการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

French Polynesia

ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2528 ไม่มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ จากการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อ LAV/HTLV-III ในชายซึ่งมีพฤติกรรมแบบรักร่วมเพศ 80 คน หญิงอาชีพพิเศษ 29 คน และผู้รับบริจาคโลหิต 33 คน ไม่มีผู้ใดที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้เลย การตรวจโลหิตที่ได้รับบริจาคเพื่อหาระดับภูมิคุ้มกันต่อ LAV/HTLV-III และการควบคุมผู้ที่เสี่ยงต่อการป่วยจะช่วยสกัดกั้นการแพร่กระจายของโรคนี้

Ghana

จากการตรวจโลหิตผู้ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ จำนวน 310 คน ด้วยวิธี IFA (Indirect immunofluorescence antibody technique) Noguchi Memorial Institute มหาวิทยาลัยกานา พบว่าไม่มีผู้ใดมีภูมิคุ้มกันต่อ LAV/HTLV-III

ญี่ปุ่น

ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2528 มีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดส์ 11 ราย เป็นชาวญี่ปุ่น 10 ราย และชาวต่างชาติ 1 ราย ผู้ป่วย 6 ราย เป็นพวกรักร่วมเพศ และอีก 5 ราย ป่วยเป็นโรคเลือด (Haemophilia) ผู้ป่วยรายแรกได้รับการวินิจฉัยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2528 5 รายต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2 รายเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม และอีก

3 รายเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2528 ผู้ป่วย 6 ราย ซึ่งได้รับการวินิจฉัยเมื่อเดือนพฤษภาคม
กรกฎาคม และตุลาคม เสียชีวิต (ผู้ป่วย 2 ราย เป็นพวกรักร่วมเพศ อีก 4 รายที่เหลือเป็น
ผู้ป่วยโรคเลือด) ผู้ป่วยทั้ง 6 ราย เป็นผู้ป่วยซึ่งได้รับรายงานจากโรงพยาบาลของรัฐ
จำนวน 574 แห่ง

WHO European Region

ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2528 มีประเทศซึ่งรายงานว่าพบผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์
เพิ่มขึ้นอีก 1 ประเทศ พบผู้ป่วยเพศชาย 2 ราย อายุ 29 และ 36 ปี ผู้ป่วยรายหนึ่งยังคง
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยรายนี้มาโรงพยาบาลด้วยอาการมีไข้เป็นเวลานาน เหนื่อยออก
น้ำหนักลด แขนขาไม่มีแรง อูจจาระร่วง คอมน้ำเหลืองโตและเกิดการติดเชื้อประเภท
Opportunistic infection ผู้ป่วยอีกรายหนึ่งได้รับเชื้อจากต่างประเทศ ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย
ได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี ELISA

(แปลจาก WHO : Weekly Epidemiological Record; 1986 61,26-27)