

สถานการณ์โรคสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในทวีปยุโรปInfluenza Activity in European Countries

รายงานเฝ้าระวังโรคขององค์การอนามัยโรค (Weekly epidemiological record) ประจำอาทิตย์ที่ 2 - 9 เดือนมกราคม 2530 ได้ตีพิมพ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จากเชื้อ Influenza A (H₁N₁) ในกลุ่มเด็กและคนหนุ่มสาวของประเทศยุโรปตะวันตกหลายประเทศดังนี้ เยอรมันตะวันตก เริ่มมีการระบาดในเดือนพฤศจิกายน 2529 คลอบคลุม 9 ใน 16 รัฐของประเทศ ในยังการเกิดการระบาดขึ้นในหมู่บ้านสองแห่งเมื่อต้นเดือนธันวาคม อัตราป่วยประมาณ 20 % ในฟินแลนด์เกิดการระบาดขึ้นในค่ายทหารหลายแห่งของประเทศเมื่อเดือนธันวาคม ประเทศอื่น ๆ เช่น เชคโกสโลวาเกีย ยูโกสลาเวีย แม้ว่าจะยังไม่พบการระบาดชัดเจนก็มีจำนวนผู้ป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถแยกเชื้อ type A (H N) ได้เช่นกัน ในเยอรมันตะวันออก และฝรั่งเศสซึ่งยังไม่มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แต่ก็แยกเชื้อ A (H₁N₁) ได้จากผู้ป่วยบางราย ทางภูมิภาคเอเชียพบการระบาดในกรุงเทพมหานครประเทศอิหร่าน และในประเทศอิสราเอลด้วย type A (H N) เช่นกัน

บทบรรณาธิการ

ในประเทศไทยส่วนใหญ่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะแยกเชื้อ Influenza ได้ในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี ในปี 2529 พบเชื้อ A (H N₁) หลังจากนั้นจนกระทั่งปัจจุบันยังไม่พบอีกเลย เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก และคนไทยไม่น้อยไปเที่ยวในยุโรป โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรได้ระวังตรวจสอบดูการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ การยืนยันผลการวินิจฉัยทำได้โดย Nasopharyngeal swab หรือ throat swab ใส่ใน Hank's Balance Salt Solution ซึ่งสามารถขอเบิกและส่งตรวจได้ที่สถาบันวิจัยไวรัส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
