

รายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

- สถานการณ์โรคหัด- 493
ประเทศไทย
- สถานการณ์โรค 496
- รายงานการค้นหาผู้ป่วย- 501
มาลาเรีย-
สิงหาคม 2530


สถานการณ์โรคหัด - ประเทศไทย

มกราคม - สิงหาคม 2530

(Measles - Thailand; January - August 1987)


ระหว่าง พ.ศ. 2519 - 2527 ผู้ป่วยโรคหัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยที่ได้รับรายงาน 6.78 ต่อแสน ใน พ.ศ. 2517 เพิ่มขึ้นเป็น 93.67 ต่อแสน ใน พ.ศ. 2527, พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2529 อัตราป่วยเริ่มลดลงเป็น 62.22 ต่อแสน และ 37.34 ต่อแสนตามลำดับ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 Reported cases of Measles by year,
(per 100,000 pop.) Thailand, 1976-1987.




จากการเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยในแต่ละเดือนของ พ.ศ. 2530 กับค่าเฉลี่ย (มัธยฐาน) ของจำนวนผู้ป่วยในระยะเวลาเดียวกันของ พ.ศ. 2522 - 2526 พบว่าใน พ.ศ. 2530 จำนวนผู้ป่วยเริ่มมากกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายน และสูงขึ้นต่อไปจนถึงเดือนสิงหาคมแนวโน้มของผู้ป่วยยังไม่ลดลง (รูปที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบอัตราป่วยในช่วงมกราคม - สิงหาคม 2530 กับอัตราป่วยในระยะเวลาเดียวกันของ พ.ศ. 2529 พบว่า พ.ศ. 2530 มีอัตราป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9, ใน พ.ศ. 2530 อัตราป่วยของภาคกลางและภาคเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.3 และ 28.9 ตามลำดับ ส่วนอัตราป่วยของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ ลดลงร้อยละ 7.4 และ 28.8 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามมีหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ที่มีอัตราป่วยสูงขึ้น จังหวัดในภาคกลางมีอัตราป่วยสูงกว่าจังหวัดในภาคอื่น ๆ (รูปที่ 3)

รูปที่ 2 Reported Cases of Measles by Month



รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคหัด (คือแสนประชากร) จำแนกรายจังหวัด
ประเทศไทย มกราคม - สิงหาคม 2530



จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยในช่วงมกราคม - สิงหาคม 2530 สูงกว่าจำนวนผู้ป่วยในระยะเวลาเดียวกันของ พ.ศ. 2529 เกินกว่าหนึ่งเท่าคือ

ภาคกลาง : สระบุรี ตราด ลพบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี นครนายก และ ปราจีนบุรี

ภาคเหนือ : นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร และ แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ มุกดาหาร

ภาคใต้ : พังงา

เนื่องจากการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเป้าหมาย (เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี) ของ พ.ศ. 2527 - 2529 มีความครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 5.9, 25.8 และ 47 ตามลำดับ จึงสมควรที่จะเร่งรัดการให้วัคซีนโรคหัด ให้ครอบคลุมประชากรในกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะลดอัตราป่วยและอัตราตายจากโรคนี้ต่อไป

สถานการณ์โรค

โรคติดต่ออันตราย

อหิวาตกโรค

<u>เอเชีย</u>		ป่วย	ตาย	<u>แอฟริกา</u>		ป่วย	ตาย
สิงคโปร์	27 กย.- 3 ตค.	1	0	มาลี	11 ตค.	58	11
อินเดีย	6-12 กย.	122	0	<u>ยุโรป</u>		ป่วย	ตาย
อิหร่าน	21 กย.- 3 ตค.	20	0	สหราชอาณาจักร 13-19 กย.		11	0

กาฬโรค

<u>อเมริกา</u>		ป่วย	ตาย
สหรัฐอเมริกา	25 กย.	1	0

ไข้เหลือง

<u>แอฟริกา</u>		ป่วย	ตาย	i = Imported cases
มาลี	21 กย.- 12 ตค.	196 ^r	86 ^r	r = Revised figures