

รายงาน การเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์ WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

DIVISION OF EPIDEMIOLOGY MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

สารบัญ
CONTENTS

โรคไขกัฟหลังแ่อน (Meningococcal meningitis) ,พ.ศ.2536

237

โรคไขกัฟหลังแ่อน (Meningococcal meningitis)

พ.ศ.2536

ในปี พ.ศ.2536 นี้ กองระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคไขกัฟหลังแ่อน จาก 15 จังหวัด เฉลี่ยจังหวัดละ 1-2 ราย จำนวนทั้งหมด 26 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.04 ต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2535) มีผู้เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.007 ต่อประชากรแสนคน และ อัตราป่วยตายร้อยละ 15.38 (รูปที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคนี้ในปี พ.ศ.2536 พบประปรายเกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นในเดือนมิถุนายน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเลย เนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้มีจำนวนไม่มากนัก ฉะนั้นเมื่อนำตัวเลขทั้งหมดมากระจายตามรายเดือน รูปแบบของการเกิดโรคตามฤดูกาลนั้น จึงมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน (รูปที่ 2)

การกระจายของผู้ป่วยตามกลุ่มอายุ พบว่ามีการกระจายในทุกกลุ่มอายุ ซึ่งกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือกลุ่มอายุ 0-4 ปี ซึ่งเป็นเด็กก่อนวัยเรียน มีอัตราป่วย 0.14 ต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี พ.ศ.2535 เกือบครึ่งหนึ่ง รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี และ 10-14 ปี ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มีอัตราป่วยใกล้เคียงกัน คือ 0.052 และ 0.048 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (รูปที่ 3) อาชีพที่พบส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและผู้ป่วยอยู่นอกเขตเทศบาล คล้ายๆ กับ ปี พ.ศ. 2535

เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่า ในปี พ.ศ.2536 มีความแตกต่างไปจากปี พ.ศ.2535 คือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ โดยมีอัตราป่วยเท่ากับ 0.13 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง (0.058 ต่อประชากรแสนคน) ส่วนภาคเหนือซึ่งเคยมีอัตราป่วยสูงสุดในปี พ.ศ.2535 นั้น ตกลงมาอยู่อันดับ 3 (0.025 ต่อประชากรแสนคน) และอันดับสุดท้าย คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0.001 ต่อประชากรแสนคน) (รูปที่ 4)

จังหวัดที่มีจำนวนป่วยสูงสุด คือ จังหวัดพังงา มีผู้ป่วย 5 ราย รองลงมาคือ สมุทรสาคร มีผู้ป่วย 3 ราย ส่วนจังหวัดที่มีผู้ป่วย 2 ราย มีทั้งหมด 5 จังหวัด คือ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และ กรุงเทพมหานคร นอกนั้นเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยจังหวัดละ 1 ราย ซึ่งมี 8 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน นครนายก อุทัยธานี ขุมพร ตาก จันทบุรี สระบุรี และนครปฐม (รูปที่ 5)

Fig. 1 Reported cases of Meningococcal meningitis Per 100,000 Population, by Year, Thailand, 1984-1993.





Fig. 2 Reported Cases of Meningococcal meningitis by Month, Thailand, 1989-1993.



โรคไขกัาพหลังแ่อน (ต่อจากหน้า 238)

Fig. 3 Reported Cases of Meningococcal meningitis Per 100,000 Population, by Age-Group, Thailand, 1989-1993.




Fig. 4 Reported Cases of Meningococcal meningitis Per 100,000 Population, by Region, Thailand, 1989-1993.




Fig. 5 Reported Cases of Meningococcal meningitis
by Province, Thailand, 1993.

